

DE SANGUINE
ET DE
SANGUINEIS CONCRETIONIBUS

PER ANATOMEN INDAGATIS

ET PRO CAUSIS MORBORUM HABITIS


QUAESTIONES MEDICAE

*Auctore JOSEPHO PASTA Bergomate
in Patria Protophysico, Nosocomii
majoris Medico, Ac. Exc.*

~~~~~  
*Magni est ingenii revocare mentem a sensibus, & cogitationem  
a consuetudine abducere. Cicer. Tuscul. Disput. I.*  
~~~~~



BERGOMI
APUD LOCATELLUM



MDCCLXX XVI.

Dr. J. J. Langdon



NOBILIBUS AC SAPIENTIBUS

VIRIS

NOSOCOMII MAJORIS BERGOMI

PRÆSIDIBUS VIGILANTISSIMIS

HIERONYMO SICCO SUARDO COM. ET EQ.

Ministro

GALEATIO PEDROCCÆ GRUMELLO COM. EQ.

JOANNI BAPTISTÆ SCOTTO

FRANCISCO SPINO COM.

ANGELO FINARDO

PETRO COMMENDUNO

JOSEPHO BREMBATO COM.

JOSEPHO CACCIÆ

M. ANTONIO DE COMITIBUS CALEPII COM.

MARCELLO PASTÆ

JOANNI BAPTISTÆ ADELASIO

THEODORO SONZONEO

FRANCISCO BARCÆ

PRÆCLARISSIMI VIRI.

Cum officiosissime erga Vos, Ornatissimi Præsides, meę observantię causa, nec non artis quam profiteor, & potissimum ministerii quo fungor medicinam Nosocomio faciens fere sex abhinc annis, sim egomet Vobis dicatus atque devinctus; ęque nuncupari Vobis debebat Opusculum hoc meum anatomicum & medicum. Neque fortasse omnino auspiciis vestris indignum illud videbitur, propterea quod,

licet exili tenuique stylo conscriptum sit , eo tamen loci conflatum est , cui Vosmet ipsi summa cum integritate atque sapientia pręestis , maximeque Vobis cordi est , ut ibi res medica utilitatis laudibus efflorescat , & explanationem ac incrementum quotidie magis recipiat . Enimvero in hocce publico Ægrotantium receptaculo , charitati sacro vestręque curę & conditioni preclare confiso , ipse mehercle nihil observationibus nihil cadaverum incisionibus peperci , quibus tandem simul conjunctis probare conor Sanguinem & sanguineas Concretiones per anatomen indagatas immerito sepe sepius pro causis morborum

& mortis consequentis haberi ; ex quo fit , ut ab hisce fictitiis causis Professor Medicus non raro in errorem impellatur , utpote qui ab iis ipsis desumat in posterum ad morbos fugandos indicationes , quę in sanguinem insistant aut corrigendum , aut per venę sectiones imminuendum , quo nil frequentius turpiusque . Id idem argumentum egit Perillustris Andreas Pasta , cl. memorię Medicus , Consanguineus ac Preceptor meus : verum , ut mihi videtur , pluribus contraria jam ante menti insita opinio remanet . Idcirco mihi liceat vestigiis tanti Antesignani collineare , & pro viribus meis idem argumentum profe-

qui , novisque disquisitionibus ac
commentariis auctum atque illu-
stratum , & , ferme dixerim , cer-
tius factum in lucem edere . Tem-
pus , nudaque veritas me voti com-
potem faciant . Vos interim , Xe-
nodochei Moderatores Humanissimi,
meum hoc Opus qualecumque Vo-
bis oblatum tamquam specimen ob-
sequii ac servitutis meę comiter su-
scipite , illudque , ac ejus auctorem
patrocinio vestro tuemini , qui in
perpetuum erit

VOBIS NOBILISSIMIS VIRIS


Berg. Cal. Maii. MDCCLXXXVI.

Additissimus Humillimus Obsequentissimus
Joseph Pasta.



PRÆLOQUIUM

Naturam corporis esse in re medica ratiocinandi principium, Hippocrates (a) docuit; cadavera in morbis, Malpighius (b) existimat. At in incidendis mortuorum corporibus cavendum quam maxime, ne, ut sæpissime usuvenit, morborum eventus ordine inverso pro caussis ponamus, indeque error oriatur, unde eripi videretur debere. Porro haud raro quoque accidit,



(a) De Loc. in Hom. n. 4.

(b) Epist. ad Jo. Alph. Boerellum, *Op. Posthum.*
pag. 105. seq.


omnibus experientia, aut non sit habenda fides, aut non satis allatum sit lucis huic *sanguinis* motui, atque harum *sanguinearum concretionum* fabricæ: quæ quamdiu latent aut non percipiuntur diligenter, tandiu labi in caussarum, quæ morbos faciunt, cognitione, inque medendi ratione, nos sæpe contingit. Ne quis igitur in re tanti momenti diutius hæreat, meam liceat opinionem opinioni cl. mei Præceptoris addere, eamque enodatius exponere, simul & caussas afferre, quæ me impulerunt, ut quo se sanguis post mortem reciperet, ibique concrederet, tum ratiocinatione, tum experimentis inquirerem, ea semper quadam spe allectus, *par decus*, ajente Douglas (a), *mansurum & illud qui primum invenit, & qui postremum perfecit. Nescio enim an præstat invenisse, an ditasse.*



ficiscitur: ad quem ostendendum supervacaneum foret plura vasa persequi, cum satis ex iis, quæ fuerat scrutatus, inventi veritas constet.

(a) Apud Eloy, *dictionn. historiq. de la Médec.* tom. 2. art. *Harvey*.

sententiam , ut qui ante (a) scripsisset utrumque sinum cordis in dissectionibus referri sanguine *nigricante* , & *grumefcente* , idque ipsum (b) tribus locis aliis confirmasset . Et si expiratio , sub quam quisque moritur , dexterum cordis ventriculum sanguine implet , & sinistrum exhaurit , rationem inire nequiveram , cur anatome interdum ostendat (c) oppositum ; nec raro quoque modo (d) utrumque ventriculum exhibeat sanguine turgidum , mo-



(a) *Proam. cit. Exercit. pag. 15. seq.*

(b) Primum l. c. cap. 5. pag. 69. *In dissectionibus* , inquit , *anatomici semper inveniunt arteriam venosam* , & *sinistrum ventriculum cordis repletos sanguine* , eoque *crasso* , *grumefcente* , *atro* . Deinde l. c. cap. 7. pag. 90. ait : *Arteria venosa & similiter ventriculus sinister* , *repleti sunt semper sanguine* . Tum l. c. extremo cap. 17. pag. 214. hæc habet : *Arteriam venosam & sinistrum ventriculum abundare videmus* (in anatomica dissectione) *tanta copia sanguinis* , & *ejusdem quidem coloris & consistentia* , quo *dexter ventriculus* , & *vena arteriosa replentur* , *similiter nigricante* , & *grumefcente* .

(c) Hales *hamastatiq. pag. 9. Morgagnus de Sedi- bus &c. Epist. anat. XXVII. art. 2. Lieutaud Hist. anat. med. tom. II. obs. 408.*

(d) Nostris observationes consentiunt a præclarissimo Lieutaudio collectæ , *op. cit. lib. II. 317. 423. 424. 426. 431. 439. 441. 442. 444. 488. 540. 582. 588. 600. 602. 605. 772. 945.*

Cumque Harveus scripserit, ut dictum est ante, (b) parum sanguinis in arteriis post mortem deprehendi, hujusque ipse eas nunquam expertes viderim, mirabar nonnullos in ea esse sententia, ut arbitrarentur (c) universum post mortem

(a) Congruunt similiter nostris ejusdem Lieutaudii observationes *lib. I.* 1013. *II.* 40. 45. 46. 458. 459. 460. 461. 463. 645. 661. 698. 727. *III.* 55. 74.

(b) Parum sanguinis in mortuorum arteriis contineri solitum a Cl. Morgagno accepimus, sic tamen ut has interdum eo prorsus repletas se offendisse testetur, *epist. LIV. art. 25*. Plenas intra cranium cum arterias, tum venas idem recenset, *epist. VIII. art. 30*. Arterias sanguine plenissimas is idem memorat eodem loco. Pulmonarem arteriam plenam sanguine, *epist. cit. art. 31*. plenumque ejus truncum is ipse adnotat *epist. XXVII. art. 2*. Omnia vasa corporis atro sanguine turgentia Lieutaudius retulit¹, *lib. IV. observ. 62. pag. 297*. repletaque sanguine cujuslibet partis vasa ex *Actis Parisiens.* idem auctor protulit, *lib. III. obs. 88*.

(c) In horum numero est de Sauvages, *Hæmorrhag. remarg. num. 12. pag. 9. & Dissert. sur l'infamm. l. c. num. 175. pag. 280.* Eandem opinionem tenet is, quem refellit Morgagnus, *Advers. anat. II. pag. 83.* Hujusmodi quoque sunt verba Boerrhaavii, *Prælect. Acad. num. 213. Animal vivum suffocatur, aperitur, exhibebit omnes arterias parvas, consistentes tamen, albas, exangues. Nempe arteria, etiam sub-tracto sanguine, pergunt se contrahere; inde fit ut*


sanguinem ex arteriis in venas conjici ,

protrudant ad venas contenta sua , & maneat ex indole sua vacua . Nihil mihi (bona venia hujus tanti Viri dixerim) vestigiis Præceptoris insistenti tale unquam contigit vidisse , tot licet hominum , canumque corpora inciderim , auxiliantibus Doctore Aloisio Venantio M. P. acris ingenii juvene , studiis literisque dedito , magnaque in re medica de se promittente , atque experientissimo Paulo Antonio Bianchi , nostri Xenodochii Chirurgi majori , & Academ. Londinensis Membro clarissimi nominis .

Ad eorum sententiam Senacus item accedit iniquiens , de Corde lib. III. cap. 6. *Extremo morientis conatu sanguis in venas debet congeri : arterias , utpote elasticas , perpetuo exhauriri experimentis constat : earumque vis hujusmodi arteriis post mortem sufficit exinanendis* . Hi viri de ranis fortasse videntur locuti ; quarum arterias exhauriri post mortem , venas impleri observavit Malpighius , *Posthum. pag. 92.* cum Baglivio *Exper. anat. II.* aliisque . Plerumque (non tamen semper) in animalibus frigidi sanguinis id notat Hallerus evenisse : at in homine is idem auctor se nunquam arterias sanguine vacuas fatetur reperisse ; exceptionemque iis dat quoque , quæ in ranis capiunt , experimentis , *not. 4. ad cit. Boerr. l.* Ceterum natura ranis potuit , ceterisque bestiis frigidi sanguinis leges irrogasse in structura partium earundem abditas , quibus extincta vi cordis , motus quispiam maneat arteriarum venarumque , quo sanguis & contra vim insiti ponderis cieri queat , ut accuratiss. Virorum Halleri , Spallanzanique experimenta comprobant , & qui tamdiu duret , quoad arteriæ se toto in venas exonerent sanguine .

Elastica porro corpora , cum quidquam moliri , nisi flectantur , omnino non queant , deleta cordis motu , sublatoque adeo impulsu quovis sanguinis , un-

alios (a) sic nutare , ut modo totum sanguinem , modo majorem partem illinc huc trajici crederent ; alios demum ita sibi non constare , ut modo sanguinem ex arteriis in venas ferri cogitarent , modo ex utrarumque ramis compelli judicarent (b) in




denam flexio ad elasticas arteriarum fibras accedet , quarum restitutione sanguis pellatur in venas ? Eadem est ratio musculosarum fibrarum , quibus texuntur arteriæ , siquidem earum contractione urgeri sanguinem mavis in venas . *Nam nisi cor moveatur* , ut inquit Morgagnus . *Advers. anat. II. animad. 42. pag. 83. semel restituta arteria dilatari amplius non possunt , non dilatata autem non possunt contrahi ; atque adeo nisi cor moveatur , non possunt moveri .*

(a) Sanguinem post mortem in venis coacervari , arterias perpetuo exhauriri affirmat Senacus *lib. III. cap. 6.* Idemque auctor *lib. cit. cap. 7.* affirmare non dubitat sanguine arterias non carere post mortem . At quomodo exinaniri post mortem putat arterias , dum censet *l. c. cap. 6.* extincta vi cordis sanguinem e capillaribus vasis in truncos regeri eorundem ? Neque hujusce placiti circumscriptionem ab eodem assignatam satis assequor , opinante retrogradi sanguinem in arterias , si panxillus fuerit , si fili instar tenuis ; sin multus progredi in venas . Nam qui credat , vivo corpore , venas multo sanguine occupari , in arteriis vero vix ejusdem sanguinis inesse vestigium , equidem puto fore neminem .

(b) Caruisse sanguine vasorum truncos liquet ex Lieutaudii *lib. II. obs. 458. 459. 461. 462. 463.* Itemque *vena cava* , auctore Morgagno , *ep. XXIX. art. 20. dum supra , itemque infra jecur incideretur , ne guttam quidem effudit sanguinis . Venæ-portarum surculi ,*

truncos . Quam sane quæstionem , nisi suspensorum animalium corpora ad perpendiculum sita , ut sæpius egomet feci post Præceptorem meum , incidantur , facile solutam ire non credas . Supino enim corpore , dorsoque , ac cervicibus aliquantulum elevatis , cum mori soleant plures , sanguis in vasorum truncos , inque cordis sinus partim gravium lege defluit , partim eo pellitur viscerum imi ventris pondere . Fere porro plus habet sanguinis dexter cordis ventriculus , quam sinister in mortuorum corporibus , quod ille sanguinis ponderi , ejusdemque pressui multo minus quam hic resistat , quod *pariete (a)* sit *triplo tenuiori* , quod *(b)* *majorem capacitatem habeat* ; quodque in illum ipsum sanguis ex utraque cava feratur , pulmonarisque arteriæ trunco ; cum sinister nisi aortæ , venæque pulmonaris sanguini non pateat .

Nec vero intelligebam , quo pacto ar-




fuo cum trunco , depleti , flaccidi , exangues occurrerant , observante Drelincurtio , *Canicid.* 6. pag. 687.

(a) Harveus *de Corde* cap. 17. pag. m. 290.

(b) Idem *loco cit.*

teriæ aut totum ab obitu sanguinem , aut partem maximam eructare possent in venas . Quandoquidem si (a) sanguis movetur a corde , si in arterias protruditur , si in venarum angustias propellitur ; corde emortuo , omnique prorsus ejus vi , qua sanguis cietur , sublata , impulsus quoque sanguinis e corde in arterias , ex his in venas tolli videtur debere . Probabiliterque sanguinis nihilo major quantitas ex arteriis in venas id temporis transit , quo homo moritur , quam quæ unâ cæque omnium ultimâ , adeoque (b) perexiguâ , insensibilique arteriarum contractione transire queat in venas . Quæ quidem quantitas , habita ratione universi sanguinis , non potest non esse minima : propterea quod vel in integris sanisque corporibus non plus sanguinis singulis arteriarum contractionibus tran-



(a) *Vis enim & impulsio sanguinis solum a corde est* , docente Harveo l. c. cap. 12. pag. m. 144. quod confirmatum ab Hallero est *Physiol. lib. IV. sect. 4. §. 41.*


(b) *Quando cor languidius pulsât* , inquit Harveus l. c. cap. 17. pag. m. 211. non solum non in digitis , sed nec in carpo , aut temporibus pulsum sentiri contingit , ut in *lipothymia* , *hystericis symptomatibus* , *asphyxia* , debilioribus , & morituriis , idest morti proximis.

•••••

- (a) Idem *l. c. obs.* 23. & in *additam.* *obs.* 4.
 (b) Idem *l. c. additam.* *obs.* 1.
 (c) Idem *l. c. sect.* 1. *additam.* *obs.* 4.
 (d) Idem *l. c. sect.* 1. *obs.* 122.
 (e) Idem *l. II. sect.* 11. *obs.* 8. & 13. tum in *additam.* *obs.* 1. & 2.
 (f) Idem *lib. II. sect.* 10. *additam.* *obs.* 1.
 (g) Idem *lib. cit. sect.* 2. *obs.* 9. 11. 14. & *additam.* *obs.* 2.
 (h) Idem *lib. cit. sect.* 10. *obs.* 4.
 (i) Whytt de *mortis nerv. tom. I. part. 2. cap. 5. §. 88.* hæc habet in notis : *En ouvrant ceux qui sont morts de la maladie hypocondriaque, il arrive souvent*

ne distentas venas meseraicas, aliasque quæ in portam inferunt, *hypochondriaci morbi* caussas opinantur fuisse. Qui (a) *catalepsim* crasso assignant sanguini, quo majora quædam vasa cerebri replentur. Qui (b) *melancholicam affectionem* vasis attribuunt cerebri, quæ sanguine plena deprehenderint. Quique (c) eundem morbum aut sanguini adscribunt nigro, quem in tenuis meningis venis offenderint, aut (d) in corde inesse viderint.

In horum vestigiis institisse quoque Jo. Fantonum palam est inquietem (e):
Nos sæpissime turgentes præter naturam venas, quæ piam matrem perreptant, in (f)



qu' on trouve les veines meseraïques, & les autres veines, qui se rendent dans la veine porte, prodigieusement distendues par le sang.

(a) Bonet lib. I. sect. 4. obs. 1.

(b) Idem lib. cit. sect. 9. obs. 1. 2. 3. Lieutaud lib. III. sect. 5. obs. 375.

(c) Bonet lib. cit. sect. cit. obs. cit.

(d) Idem loc. cit. obs. 4. 6. 7. 9. 11. 12.

(e) Schol. obs. 25. pag. 70. cum ante scripserit num. 4. *sanguinis motus interceptionem in cerebro factam turgidissima corticis vasa ostendere.*

(f) Non solum in affectibus cerebri, sed etiam in quibusvis aliis tales sæpe apparent tenuioris meningis tam venæ, quam arteriæ. Sunt enim hujus membranæ vasa (si quæ alia) flexuosa admodum, creber-

rimis angulis atque anfractibus insignita, sæpe etiam multis varicibus prædita. Retardatur præterea sanguinis motus ut in vivis, sic in mortuis, decumbentibus, ob majorem sinuum lateralium acclivitatem, magis quam in stantibus erectisque, ut adnotat Auctor *Adversar. Anat. VI. animad. 6. pag. 8.* Hinc fit ut sanguis suo nutu post mortem, suoque pondere deorsum sic sæpe ferri non queat, ut ejusmodi vasa exinaniantur. Minusque verisimilis est eorum opinio, qui non ideo exhauriri cerebri vasa putant sanguine, quia non premuntur ab aere; nam & ceterarum partium vasa pleraque, ut ut latius aeri pateant, tumida tamen sanguine sæpe cernimus; quin & ipsa cerebri vasa aliquando sanguinis occurrunt expertia, quod tum probabiliter evenit, cum hæc eadem vasa multo pauciores ac minores, quam pro consuetudine, flexus atque anfractus nacta fuerint, nec sine frequenti & duriore succussu translata cadavera, divisumque serra cranium. Unde videtur repetenda non sine ratione inanitas, & flatulenta venarum cerebri in Virgine syncope rapta, ex Licutaud, *loc. cit. obs. 55.* Vasa deinde plexus choroidis vacua sanguine; itemque sinus falcis superior, *idem loc. cit. obs. 3.* Eadem vasa cerebri flatu distenta & pellucientia in Ætiopis corpore inter hilare ientaculum repente mortui, *idem loc. cit. obs. 56.* Flatulenta itidem ea ipsa in eorum nonnullis, quos capitis dolor occiderat, *idem loc. cit. obs. 57.* Plane inania, vel flatu repleta in viri corpore morte inexpectata sublata, *idem loc. cit. obs. 74.* Venæ cerebri flatu turgentes in cadavere mulieris apoplectica, *idem loc. cit. obs. 264.* Vasa sanguifera in corticali cerebri substantia fere exsiccata, plexusque choroidis plane inanes, *idem l. c. obs. 99.* Vasa cerebri flatu distenta, *idem l. c. obs. 281.* Vasa tenuem meningem irrigantia sanguine vacua in ejus corpore, cujus mor-

rebri vasa sanguine turgidissima observari, speciatim in affectibus capitis, vulgatissimum est, cum tamen plexus choroides inanis aliquando appareat. Ratio esse videtur, quod turgentia in cortice vasa sint (a) magna ex parte venosa, choroideum vero plexum constituentia (b) plurima sint



(a) Sic fere Natura venis socias adjunxit arterias, ut neutra neutras numero quam maxime superent. Quorsum, quaeso, spectaret tantus venarum numerus in tantillo arteriarum? Conjecturae favent accurata Ruyschii experimenta, *Thef. anat. I. num. 13. not. 1. tab. 4. fig. 3.* quibus tenuis meningis arteriae tam numerosae exhibentur, ut ex his eadem ferme constare videatur. Produci quoque ex iisdem corticalem putat, *loc. cit. num. 10. in notis*, cerebri substantiam: easque ipsas, *Prodrom. Thef. 6. pag. 10.* non solum ope microscopii, verum etiam oculis inermibus esse conspicuas. Perelegans etiam arteriarum crassioris meningis iconismus, *Thef. anat. 5. tab. 2. fig. 4.* persuadet de miro arteriarum eandem membranam perreptantium numero: ut quos morbos legeris ductos a vasis meningum, aut cerebri sanguine turgidis, ignarus quodnam genus fuerit vasorum, utrumque posse comprehendere intelligas velim; quod scriptores proprium vasorum nomen saepe numero praetermittant, quorum aliis otium desit, aliis fortasse dexteritas ejusmodi vasa sive scalpelli, sive injectionum ope, quae parvula fuerint, internoscendi, quoniam, auctore Harveo *Proam. op. cit. pag. m. 13. parvas disseminaciones arteriarum, quales in cerebro, nemo per tunicas a venis poterit distinguere.*

(b) E vasculis sanguiferis constare hunc plexum, ac potissimum arteriosis, fatetur etiam Ruyschius,

arteriosa. Notum est autem (a) multo majorem liquidi copiam in venis semper reperiri, quam in arteriis, quia venarum major est numerus, & amplior diameter: arteriæ multo magis quam venæ contractiles sunt, ideoque in venas (b) facillime ex-



Respons. ad Ettmull. pag. 21. quæ cum raro compere-rit rubicundo turgida sanguine, observationem affert Vieussennii scribentis *se in hominibus gravioris ætatis vel humidioris temperamenti plexum choroideum non e vasis sanguiferis, sed potius lymphaticis conflatum vidisse.*

(a) Denus majorem sanguinis copiam in venis reperiri post mortem; sunt enim & ampliores, & numerosiores venæ, si pulmonarem excipias; non itidem dabimus id omne, quod plus sanguinis continent venæ, in has ipsas esse post mortem ex arteriis traductum. Numquid quia dextera cordis auricula est capacior sinistra, & ventriculus dexter sinistro est amplior, iccirco putas ea utrosque capacitate finxisse naturam, ut sanguis in eos conjiceretur post mortem? postquam ostensum est ab A. Pasta *epist. cit. de mot. sang. post mort. pag. 5.* in suspensis incisisque canum corporibus nihil quidquam sanguinis iis in locis constitisse, sed totum ut plurimum ex eisdem ipsis locis in inferiorem cavam descendisse, propria gravitate abreptum a corde; aut quia *arteria pulmonaris sodalem venam diametro & numero ramorum superat*, Haller. *physiol. lib. IV. sect. 3. §. 3.* iccirco arbitraris ad sanguinem post mortem recipiendum ea fuisse proportionem constructam? postquam *multo majorem copiam sanguinis in venis, quam in arteriis* perpetuo reperiri e Fantono, aliisque perceperis.

(b) Nihil refert, venas esse admodum extensiles,

*tenfiles (a) omnem fere sanguinem expri-
munt. Ac in iis quidem, qui convulsi mo-
riuntur, majorem adhuc sanguinis copiam
a vehementi partium contractione propelli
in venosos canales (b) oportet.*

si vires, quibus eandem ipsæ extendi queant, post mortem non manent.


(a) Huic assertioni repugnant observationes nostræ in canibus aliisque animalibus factæ quin & in hominum cadaveribus. Plenas intra cranium cum arterias, tum venas profert Morgagnus, *epist. VIII. art. 31. & XXVI. art. 21.* itemque *XXVII. art. 2.* Arterias crassioris meningis sanguine sine modo turgidas detexit Licutaudius *lib. III. obs. 296.* Eas idem in cerebro maximopere dilatatas prodidit, *lib. cit. obs. 254.* Arteriosa demum in cerebro canis vasa sanguine vehementer tumentia Morgagnus ex auditu refert, *epist. VI. art. 15.*

Quandoquidem sanguis post mortem neque arterias quasque deserit, neque quasque implet venas, sed in utrisque pondere deorsum fertur, nulla vi impediēte, in imisque vasorum sedibus consistit, inque iis continuo concrescit, si videlicet sit ad concrescendum aptus. Quamobrem sæpissime arterias quasdam, aut earundem segmenta quædam sanguine prorsus, aut maxima ex parte vacua; universas vero eodem jejunas nondum sane deprehendimus.

(b) Ut talis vis adsit, quam auctor desiderat, necesse saltem esset, ut convulsiones inciderent, homine mortuo, quod probatu perarduum. Nam si ad viventem accedunt, aut iis fortasse non incitabitur sanguis (ut vehementissimis opisthotonis, & spasmis hystericarum, nec pulsum incitari, nec sanguinem accelerari sæpe vidit Haller. *Physiol. lib. VI. sect. I. §. 36.*)

§. III.

Quorum sane virorum observationes non modo causam quæ morbos effecerit nobis non videtur ostendere, sed eidem tenebras & caligines offundere, quibus lateat occultius. Eccui enim in *apoplectici*, *epileptici*, *vertigine* aut *dolore capitis* sublati cadavere vasa cerebri occurrunt sanguine turgida, aut in *syncope* rapti, sinus cordis vel ejusdem majora vasa vel coronaria oppleta sanguine, quin putet morbum ab eorundem repletionem fuisse profectum? Quin similibus morbis non aliter succurri existimet posse sanguinem cum incitando, tum maxime iteratis ejusdem detractionibus minuendo? Ipsi certe apoplexiam, syncopem, aliaque tam capitis quam cordis, ceterarumque corporis partium mala effici sæpe sanguine posse aut redundante, aut depravato, aut intercluso, non modo non repugnamus, sed fa-



aut sic incitabitur, ut ex arteriis in venas, ex his in cor, e corde in arterias feratur, nec ante hujusmodi cesset motus, quam homo decedat.


cile libenterque concedimus , sanguinisque missionem , ut æquum est , magni facimus , eaque & utimur quotidie in morbis curandis , & alios , qui ea utuntur , magnopere laudamus , modo ne indiscriminatum ad quosque morbos utantur ; sed sanguine factum fuisse idcirco morbum , quod vasa sanguifera eo tumida ac turgida offenderis , valde tibi assentiri non queo .

Nam inflationem illam tumoremque vasorum ortum post mortem fuisse verisimile est , nequaquam eidem antevisse , ut in numero caussarum habeatur , quæ consumpserint hominem . Quin etiam si quispiam vasorum tumor ante mortem extiterit , haud quaquam talis post obitum manet , sed aut increseat necesse est , aut minuat , aut omnino dissolvatur , alioque dissipetur . Et enim vis ponderis , qua sanguis pollet , simul ut sui juris est (quod non ante accidit , quam cordis vis extinguitur) sanguinem de sede sua dimovet , deorsumque , quo gravia quæque conantur accedere , confestim detrudit : ut si vasorum illa sanguiferorum inflatio atque satietas , in eo corporis positu quo quis moritur , sedem habeat , quæ ab horizonte propius absit , augeatur oporteat novo

sanguine in eandem ipsam sedem e vasis ab horizonte remotioribus defluente ; sin in altitudine vasorum consistat , quæ sint ad perpendiculum , vel quoquo modo ad horizontem inclinata , evanescat necesse sit deturbeturque ; idque ocyus tardiusve (brevis tamen semper , nisi canales minimi fuerint ac flexuosi) prout major ; aut minor fuerit angulus inclinationis . Si vero vasa sanguine tumefacta sic posita fuerint , aut conformata , aut partim sanguinis in iis conquiescat , partim in inferiora feratur naturali ponderum motu ; imminuetur tumor vasorum , prout major aut minor fuerit sanguinis ex his eisdem vasis effluxus .

Sustinetur igitur sanguis in vasis ventium , fulciturque vi cordis , qua deleta cum hominis vita , sanguis , quem occupat locum , continuo deserit , ut si editus fuerit , infimum petat , sin infimus , in hoc conquiescat , eique id sanguinis adjungatur , qui relictis superioribus sedibus ruit suo deorsum pondere in sedem prioris . Quæ sane perspicua satis esse debent iis , quæ supralaudatus A. Pasta habuit , experimentis , quæque ipse confirmavi deinceps pluribus aliis ejusmodi , in canibus ,

Nec aliter sane percipi facile poterat motus hic sanguinis, scitu medicis quam maxime necessarius, nisi canes aliaque animalia incidendo perpendiculari ad horizontem situ, in quo fuerint jugulata. Primum enim (a) quantum arteriæ sanguinis post mortem, quantum contineant venæ, luculenter apparet. Tum non minus perspicuum est, cur quædam arteriæ, quædam venæ, aliaque sanguinis domicilia, ut cava cordis, ut crassioris meningis sinus, interdum sanguine turgida occurrant, interdum semiplena, interdum etiam omnino exhausta. Ex quo nec quod sint ple-




§. IV.

Ad extremum facile percipies motum hujusmodi sanguinis neque ab attractionis vi proficisci, neque ab aere putredinis ope evoluto, neque ab elasticitate articularum, neque a partium corporis pondere, neque a frigore ambitus corporis, ut opinatur Hallerus (a), sed omnino a pondere ejusdem ipsius sanguinis. Nam si major fuerit attractio vasorum minimorum, quam maximorum, ea sanguinem e maximis vasis congerere deberet in minima; sin minor, e minimis in maxima. Attamen sive major, sive minor fuerit horum, vel illorum canalium attractio, sanguis perpetuo transit e truncis vasorum, ramisque majoribus in minores, siquidem terræ cen-



(a) *Physiol. lib. VI. sect. 1. §. 43.* ubi postquam scripserit, id fere præstare frigus, quod naturalis sanguinis gravitas, in ciendo post mortem sanguine; in x se, ait, credere, frigus idem ipsum *principem causam esse, quæ facit, ut sanguis etiam post mortem ad majora vasa confluat*; quamvis alibi, nimirum *Memoir. II. sect. 8. exper. 235. num. 5. le concours pres- que constant du sang veineux qui se fait vers les troncs, apres que le coeur a perdu son pouvoir sur lui*, ad vim attractionis, sanguinis particulis insitam, revocaverit.

tro hi fuerint propiores, ut in quadrupedibus, qui jugulentur atque incidantur suspensi; sin remotiores, ut in contrario bestiarum earundem positu, e minoribus in majores ramos defertur, inque truncos eorundem. Par est ratio, si velis a sanguine attrahi sanguinem, ut hujus major massa alliceat ad se se, trahatque minorem. Etenim sanguis in suspensis corporibus sæpius (a) refugit a corde, & vasis



(a) Sanguis arteriarum, quæ sunt infra vinculum collo injectum suspensi canis, partim in descendentem aortam, partim in sinistrum ventriculum defluit, pulmonaremque venam. Qui vero per socias venas in dextrum cordis sinum delabitur, fere non moratur ibidem, sed in inferiorem cavam, inque ejusdem ramos demittitur; pars etiam arteriam pulmonarem subit. Ideo vero non manet in corde, quia imi ventris viscerum pondere sic distrahuntur tendunturque majora vasa cordis, ut vel aortæ truncus rectus fiat ex curvo, corque apice elevato angulum rectum cum vasorum truncis efficiat, sanguinemque sinat effluere. Quæ tamen non ita constantia sunt, ut ne interdum variant: etenim nuperrime in suspenso grandiori molosso, cujus pedibus posterioribus, quo facilius laqueo suffocaretur, ingens lapis appendebatur, hora ab obitu elapsa cor situm perpendicularem obtinebat, ejusdem mucrone aliquantulum sinistrorsum exporrecto. Ventriculus dexter cum adnexa auricula, itemque arteria pulmonaris grumosum calentemque sanguinem continebant: partim enim ibi constiterat, partim se in pulmonarem venam receperat. In vena cava supe-

cordi proximis ubi plurimum in vivis est sanguinis ; ut in vasa descendat , in quibus ejusdem liquoris est minus , quippequæ sint angustiora superioribus .

§. V.

Moveri deinde sanguinem posse post mortem vi aeris ob humorum putredinem evoluti , tum ratio persuadet , tum vel maxime (a) observata confirmant . Sed quis facile putredinem conceperit tam cito ortam in sanis atque valentibus bestiis , non morbo interemptis , sed laqueo ? Ut



riori sanguis digitum assurgebat . Ratio porro cur sanguis tantum non descenderit , quantum in ceteris experimentis , videtur a pondere repetenda appensi lapidis , quo potissimum cava utraque vehementius distracta depressioris elipsis figuram referebat , ut duplo minus sanguinis contineret , quam solet . Interim sanguis in imas quasque sedes hepatis , lienis , ventriculi , renum , & muscutorum visus est descendisse . Nam superiores fere pallebant , nulloque cruore madebant incisæ , secus atque eveniebat in pronis . Sic e thoracis musculis scalpello pertusis nihil effluxit sanguinis ; cum multum ex iis , qui sunt in abdomine , erumperet . Ut mirari desinas si legeris apud Lieutaudium *lib. III. sect. 2. obs. 74.* varias corporis sectiones fuisse plane siccas .

(a) Quæ legere licet , summa cura conquisita atque collecta ab Hallero , *Physiologia* , *lib. VI. sect. 1. §. 43.*

statim a morte erumpentis vi aeris sanguinem cieat ; ut is perpetuo deorsum , nisi quid obstet , e regione urgeatur .

§. VI.

Arteriarum præterea elasticitate , quæ post interitum maneat , aut totum sanguinem , aut maximam ejus partem in venas compelli suspicari vix possum ac ne vix quidem . Nam elastica corpora , nisi flectantur , restitui nequeunt ; nec sanguinem , nisi restituantur , urgere . Deleta porro vi cordis , undenam earum flexio ? Hinc non plus sanguinis trajici in venas potest , quam quantum una arteriarum restitutione queat trajici . Quæ quidem extremo spiritu minima sit oportet , ut dictum est ante , qua minimum sanguinis deduci queat in venas . Nec aliter rem se habere nostra declarant experimenta .


§. VII.

Tum partium pondere nemo , ut arbitror , facile assequetur , quomodo sanguis

post mortem propelli possit in venas , nisi
 (a) partium pondus hujusmodi fuerit , ut
 pressu serpendo progrediatur ex arteria-
 rum truncis in principia venarum , donec
 exhauriantur arteriæ , & impleantur venæ ;
 at ubinam tale quoddam pondus ? Cui
 præterea , quaecunque fuerit , nostra ad-
 versantur experimenta .

§. VIII.

Denique qui constrictis frigore vaso-
 rum minimorum fibris statuunt sanguinem
 in interiora conjici , minus videntur atten-
 dere , quod in iis nasus , ac genæ live-
 scunt , qui ore prono decedunt ; contra
 in iis pallent , qui supino : quod magno



(a) Ad deplendum arteriarum sanguinem require-
 retur , ut pondus partium corporis nisu quodammodo
 peristaltico , truncos arteriarum urgeat versus extrema
 earundem ; tum etiam necesse esset , ut ejusmodi pon-
 dus venarum truncis parcat ; aliter sanguis e majoribus
 utriusque generis vasis compelleretur in minima . Si
 vero partium pondus æque venas ac arterias afficit ,
 quaecunque id fuerit , & quoquo modo demum agat ,
 longe ei minus venas , quam arterias resistere verisi-
 mile est , quæ robustiores sunt venis , ita ut multo faci-
 lior aditus sanguinis venosi in arterias videri queat ,
 quam arteriosi in venas .

argumento est non frigori , sed sanguinis ponderi utrorumque deberi colorem : frigus enim æque cutis arctat vascula in iis qui intereunt proni , ac qui supini ; adeoque in utrisque cutis pallere deberet , a qua sanguis subtrahitur . Accedit , quod haud semel didici , livorem ora prona contraxisse post mortem etiamnum calentia . Sed incisis etiam corporibus animalium , quæ ad perpendicularum fuerint , adhuc usquequaque calentibus , sanguinem defluxisse vidimus , in aliis quidem e truncis vasorum in ramos , in aliis in truncos e ramis , eo tamen semper , quo ferri sanguinem ipsius ejusdem pondus , ac gravitas cogit .


§. IX.

Ad Historiam vero quod pertinet hujus sanguinis motus , quem ex ejus gravitate pendere declaravimus , antequam Morgagnus elaboratissimum opus ederet suum *de Sedibus & causis morborum per anathomen indagatis* , in ea sententia erat A. Pasta , ab nemine de sanguinis hujusmodi motu quidquam memoria dignum fuisse literis proditum , eaque gloriâ , quasi labo-


[illegible]

(a) Quod idem ipsum confirmat, *Consult. med.* 141. pag. 157. his verbis: *Pulmones, ut solent, a tergo ad lienis colorem erant conversi*. Post Guarinum Harveus similiter videtur hunc sanguinis motum attigisse, *de Circul. sang. cap. 15. pag. m. 166.* in quibus: *videmus a frigore exteriori extremitates aliquando algere, ut lividi & nasus & manus & genae quasi mortuorum appareant, quia sanguis in ipsis (qualis cadaverum, locis pronis, solet decumbere) consistat*. Illud hujus magni Viri mirabile, quod cum gravitatem, ejusque vires in mortuorum sanguine agnoverit, in eo non agnoscat viventium. Etenim putat, sanguinem sponte sua versus principium (quasi pars ad totum, vel gutta aquæ sparsæ super tabulam ad massam) facile concentrari & coire, *loc. cit. pag. 170.* Proclivis enim, idem addit, *loc. cit. pag. 171.* est & magis pronus sanguis, ut a circumferentia moveatur in centrum quam contra. Cor quippe est centrum motus, Sauvages *loc. cit. pag. 250. num. 109.* non sanguinis; cujus centrum, ut gravium quorumlibet, est medium telluris, quo gravia quæque nituntur per lineas horizonti perpendiculares. Cor porro, vasaque sanguifera sanguinem a tali motu deturbant, eumque contra gravitatis suæ vim in viventibus urgent. Deleto autem cum vita hominis cordis vasorumque impulsu, exemplo sanguis proprio pondere in imas vasorum sedes descendere nititur, in eisque quiescens, brevi concrevit, siquidem sit ad concrendum idoneus.

bus medicis motum sanguinis indicasse , qui a pondere post mortem oritur , ex Morgagno habemus ; sed mirari satis non queo , tantum hunc Virum , quippe A. Pastæ amantissimum , cum hanc Guarinonii sententiam protulerit , suam *de Motu sang. post mortem Epistolam* , quam corrigendam & emendandam , antequam ederetur , ei tradidit , quamque multos menses in manibus habuit , silentio præterierit , captaque ab eo experimenta eundem motum illustrantia , auctoritateque deinceps Halleri fulta , siluerit . An quod minus fuerit persuasus ? An maluerit Vir humanissimus de Eo ipso silere , quam convellere , evertereque quæ scripserat ? Quamquam illud magis mirum videri debet , quod cum assentiatur Guarinonio affirmanti , sanguinem post mortem e corde in pulmones defluere , e supera videlicet in imam sedem , supino corpore , non itidem Pastæ assentiatur ostendenti descendere sanguinem ceterarum quoque corporis partium ; & si ceterarum , quomodo tueri queat quæ (a) deprehenderit , vasa post




(a) Cum sæpius rubere ac tumere partes superiores in peripneumonicis viderit Morgagnus , non



(a) *In ventriculo cordis dextero, annexaque auricula, nihil adnotavimus, nisi sanguine, ut fere sinistra quoque auricula, omnino carebant, cum pulmonaris arteria truncus esset eo plenus, Morgagnus epist. XXVII. art. 2. Cordis auricula dextera, idem inquit epist. VIII. art. 30. in duobus hydrophoborum cadaveribus acere dilatata: ipsum autem cor in totidem siccum; in uno flaccidum & extenuatum; ventriculis in uno prorsus sanguine carentibus; in uno polyposas tenues concretiones habentibus; in tribus autem sanguinem; sed in uno non multum, & picis similem nigra, ac semiliquata; in altero concretum sine ullo propemodum sero; in tertio autem sic ut dexter quidem sanguine plenus esset grumoso.*

quasi talia putanda sint extitisse ante mortem , & quomodo post mortem arteriosi sanguinis transitum (a) in venas possit as-




cum sinister plane fluidum contineret . Et paulo post addit : *Unius arteriæ sanguine plenissima , venæ propemodum inanes ; alterius autem vena sine pari ferme vacua , sed iliaca maxime distenta , arteriæ autem sociæ inanes , æque inanes per collum & jugulares internæ venæ , & carotides arteriæ , ut æque plena intra cranium cum arteriæ tum venæ , quod & in aliis duobus , ut modo indicavi , adnotatum est . Eademque epist. VIII. art. 31. hæc demum habet : de sanguine , quo plenissimas fuisse arterias alii scribunt , eoque fluidissimo . . . non desunt qui in uno doceant arterias quidem eo plenas , sed & venam cavam fuisse , in altero autem sanguinem omnem fuisse in venis , eumque sero caruisse . Imo est qui confirmet in tredecim cadaveribus sanguine non raro alioquin fluidiore , venas semper ab se visas esse repletas , arterias autem inanes . Hæc ex aliorum observationibus collegit Summus Professor Patavinus tamquam animadversione digna . Ubi notandum tum carere sero sanguinem mortuorum , cum aut permanserit fluidus , aut expressum nondum ex eo fuerit serum , aut ita expressum , ut concussu cadaveris , viscerumve tractatione sic sero rubri sanguinis globuli permisceantur , ut serum ipsum fluidi sanguinis speciem induat . Vid. A. Pastam *epist. de mot. sang. pag 6* . Ubi vero dicuntur in tredecim cadaveribus arteriæ sanguine caruisse , admodum probabile est eas non satis ubique fuisse exploratas ; nam in hominum corporibus , quotquot incidimus , inque suspensis quadrupedibus , quotquot observavimus , nunquam vacuas arterias vidimus , nunquam sanguinem universum coacervatum in venis .*

(a) *Advers. anat. II. animad. 42. pag. 83. ubi ob ultimum , inquit , cordis impulsus , ob arteriarum se*

serere, sane non assequor. Quidquid enim horum attigeris, *ulcus* est, si sanguinem omni gravitate spolies, cum homo decesserit. Nam ea manente sanguis cujuslibet partis perpetuo deorsum e regione fertur, ut cumulator vasis in aliis, parcius subsidat in aliis, in quibusdam ne vestigium quidem ejus ullum appareat. Neque ejus quidquam post mortem ex arteriis in venas transit, nisi fortasse, ut ante dictum est, admodum paullulum.

§. X.

Sed non modo doctissimum Morgagnum, sed etiam quotquot Guarinonium consecuti sunt, viros præstantissimos, anatomicarumque observationum scriptores præclarum ipsius Guarinonii inventum a con-



restituentium constrictionem, ob circumprementium partium pondus ita concedo maximam ut plurimum partem sanguinis ex arteriis in venas compelli, ut tamen admodum in non paucis cadaveribus me magnam sanguinis partem in arteriis observasse. Ad definiendam porro venosi arteriosique sanguinis quantitatem nihil plus confert, quam animalium corpora incidere ad perpendiculum sita, ut in nostris experimentis.

suetudine non deterruit accurate quidem , sed sane perperam , enarrandi quibus in cadaveribus cor sanguine turgidum , quibusprehenderint vacuum : quas venas , quasque arterias eodem refertas , aut carentes inveneriat : si pulmones exangues , & viscera quæpiam alia aut arida & sicca , aut sanguine onusta se eorum visui obtulerint : si crassioris meningis sinus , aut vasa cerebri plus aeris , quam sanguinis , aut aerem tantummodo contineant ; vel contra multo , crassoque sanguine sca- teant.

Quibus vix dici potest , quantum quisque fidem habeat ; quasi statim ac homo vitam amiserit , & amittere sanguis debeat gravitatem , eumque vim induere quasi magneticam , qua sic vasis adhæreat , ut divelli vi quavis extrinseca ullo modo non possit . Aliter namque situs sanguinis mutetur in vasis oportet post mortem , ut eum qualemcunque & ubicunque compere- rint , reticuisse scriptores satius fuisset , quam literis tradere , utpote qui sæpe fallere medicos queat , & præposteram medendi rationem asciscere .

Nemo namque , qui maxima momen- ta ponderis in mortuorum sanguine agno-

•••••

(b) Harveus , *Exercit. de mot. sang. cap. 16. pag.*


(b) Harveus , *Exercit. de mot. sang. cap. 16. pag. m. 173.* Jure quoque ac merito dubitaveris an palpitatio- nis , quæ hominem repente sustulerat , animi ægri- tudinibus confectum , caussa fuerit cor quasi sanguine obrutum , auriculæque ejusdem eodem ipso maximo pe- re turgidæ , Lieutaudius , *ex propr. advers. lib. II. obs. 582. pag. 11.* an dolore , mæroreque conflictati senis sit mors repetenda ab insigni copia sanguinis qua cor obruebatur , *idem l. c. obs. 444. pag. 13.* Nec immerito de iis quoque dubitandum quæ leguntur apud Boerthaavium *Praelect. Acad. in Instit. tom. II. num. 159. pag. 35. seq.* hujusmodi : *In hominibus subita morte extinctis solere cor dexterum sanguine plenum , sinistrum vacuum esse .* Cui quidem sententiæ plane non est Morgagnus assensus , *epist. med. anat. XXVI. art. 13.* cum plures repente mortuos noverit , affe- ratque , in quibus non dexter , sed sinister ventriculus cordis copia scateret sanguinis , qua cor obrutum , mortemque inde ortam repentinam censet fuisse : quæ pariter non sine dubitatione puto esse accipienda .

cesserit (a) pulmonum nigrorem ob copiam probabiliter sanguinis illuc congestam, cum corde exangue in mulieris corpore *aquis submersæ* deprehensum, interiui ejusdem anteivisse. Sed de hac observatione, tribusque aliis, quas modo adduximus, scitius opinatus fuerit, si dixerit, non ante cor vasaque ejusdem majora vacasse sanguine, quam egerit homo animam; ut si pulmones sanguine saturentur post mortem, cor vero & majora ejusdem vasa exhauriantur, ii iccirco saturantur, quia homo in eo corporis positu animam efflarit, in quo pulmones imam sedem occupent, cor vero & majora ejusdem vasa, e quibus sanguis defluxit, sita sint in summa. Sicut e contrario cor obrutum sanguine cernere in iis licet, qui prono corpore interiire, & pulmones ferme jejunos; aut si supino, thorace tamen, ut plerique solent, nonnihil elevato, ut venæ arteriæque succlaviæ, nec non jugulares venæ, arteriæque carotides, ac vertebrales sanguinem in cor inque hujusdem vasorum truncos, quod sita infra sint, affluentius demittant.


§. XII.

Non denique est ignorandum haud raro evenire, ut statim ab obitu, aut multas post horas, iis magnopere intumescat abdomen, qui aut brevibus, sed longe maximis gravissimisque morbis fuere consumpti, aut, quod sæpius usuvenit, submersi periere, aut casu ab alto, aut ustione, aut acceptis vulneribus, aut suspendio e vita migrarunt. Abdominis porro tumore urgetur diaphragma, & cor, ejusdemque inde attolluntur vasa, ut sanguis, qui hæc occupat, nisi fortius creverit, de loco depellatur oporteat.

Quo probabiliter videtur referendus casus ab Harveo memoratus (a) (nisi for-



(a) Harvei observationem, de *Circ. sang. Exercit. III.* affert Morgagnus *epist. XIX. art. 9.* estque hujusmodi; Ego aliquando in cadavere humano noviter strangulato, intra duas horas a suspensione aperto pectore & pericardio, antequam faciei rubor evanuerat, auriculam dexteram cordis, ac pulmones plurimum distentos & infarctos sanguine, multis adstantibus ostendi, præcipue vero auriculam, ad maximi hominis pugni magnitudinem, turgentem, adeo ut disruptum iri putares. Quæ moles die sequenti, refrigerato penitus corpore & per alias vias cruore dilapso, detumescens evanuerat.



Ceterum non facile potest dilabi per alias vias sanguis homine mortuo, postquam aliquo propria gravitate defluerit, ibique conquieverit, nisi mutato corporis positu, vasorumque una sanguiferorum. Ex quo valde probabile est aut post primam corporis inspectionem ab Harveo factam, motum fuisse cadaver, aut fortasse etiam sic intumuisse abdominis partes sive ob aerem fixum vi putredinis evolutum rarefactumque, sive ob *convulsivam* partium abdominis tensionem (nam & penis subrigidi ab obitu mentionem facit Lancisius, *de Subit. mort. lib. II. obs. 4.* Morgagnus, *epist. XIX. art. 19. & 20.* Garmannus, *de Mirac. mortuor. lib. I. tit. 11. §. 7. seqq.*) ut vini diaphragmati, cordique intulerit, qua hoc ita potuerit erigi, ut auriculæ sanguis in cavam delaberetur venam.

Neque aliter, credo, senties de Ste-
nonis observatione (b), qui *post aliquot*

(a) Putatur cordis auricula sanguinem ejecisse congestum, alioque transtulisse frigore contracta. Sed cum auctor sileat transfusum fuisse in cor sanguinem ex auricula, credere licet eundem alio fuisse derivatum. Igitur in vasa a corde atque ab auricula remotiora, at hæc citius frigent atque contrahuntur, quam quæ proximiora sunt cordi, & quam cordis auriculæ. Si ergo frigus sanguinem regeret, aut sanguis manere in cordis debuisset auricula, aut si hæc amplius dilatari potuisset, novum potius sanguinem recipere verisimile est debuisse a remotioribus vasis frigore contractis, quam, quem ipsa continuisset, in aliena conficere dissitaque a corde vasa, antequam ipsamet auricula frigore percussa contrahi ad sanguinem expellendum arctarique posset. Præter hæc vasa corporis, in quibus sanguis post mortem insit, sic affici frigore, aut eorum cellulosa fila sic sponte attrahi, ut magnopere arctentur, plane mihi nundum liquet. Quippe in suspensorum canum venis arteriisque majoribus, tum in iis, quæ imum ventrem percurrunt, tum in cruralibus anterioribus sanguis, ut sæpius vidi, nihilo altius assurgit postero & consequenti die, quam primo, hora nundum elapsa ab injecto collo laqueo, calentes universo corpore.

(b) Hæc habet Hallerus, *Instit. Boerrh.* tom. II. pag. 34. not. (13): *Post aliquot horas cor vacuum a morte repletum in aperte cane, Stenonis, Act. Hafn.*

Motum vero sanguinis omittimus, qui *derivationis* nominatur (quo de videndus Illustris Hallerus (a), & Præclaris-


pag. 142. quod, inquit, contra Pastam facit. Non video equidem, cur contra Pastam faciat. Num quod sanguis post mortem, ut idem ait Haller. l. c. pag. 35. moveri pergit propulsus ab vasorum elatere aucto per ipsum frigus, quod a morte oritur? Cui quidem sententiæ experimenta non congruunt supra recensita, & in nota huic ipsi antecedente exposita.

(a) De hoc motu hæc prodidit Hallerus, *Physiol. lib. VI. sect. I. §. 43. Superest etiam a morte vis ponderis, eaque, quando aliæ causæ cessant, sola humores regit. In canibus vario in situ dispositis, reperit An-*

simus Spallanzanus (a) tum quod se non prodat in mortuis, nisi vasorum sanguiferorum incisione; tum vel maxime quod in hominum, quadrupedumque corporibus primum principemque a morte motum eum esse sanguinis, quem ab insita ejusdem gravitate proficisci didicimus, siquidem experimentis adhibenda fides est, aperte constat.

§. XIV.

His positis animadversionibus, quibus docemur fallere nos solere sanguinem, qui in cadaverum vasis aut cumulator, aut



dreas Pasta ad eam semper corporis partem sanguinem se recipere, qua ima fuerit, & quam ex vi gravitatis occupat. Attamen si ranas mittamus, aliaque hujusmodi insecta, *vid. §. I. not.*, & canum corpora, quæ ab hominis fabrica propius absunt, velimus inspicere, facile apparebit principem causam motus sanguinis post mortem eam esse, quæ ab ejusdem gravitate progignitur. Siquidem nec externarum partium frigus, nec particularum sanguinis attractionem, nec vim vasorum ullam elasticam, nec partium corporis pondus, nec aerem vi putredinis evolutum (ut probare conati sumus §. VI. VII. VIII. IX. X.) sanguinem statim a morte ciere, sedes, quam is occupat, luculenter ostendit & plane suadet.

(a) Dissert. IV. *de' Fenom. della circolaz. ec.*

(b) Morgagnus *de Sed. & Caus. morb. epist.* 29.

(c) Idem *epist.* XXIV. art. 27. ait : Quantum detrimenti a polypis res medica retulerit, non obscure significatur, cum in tot cadaverum inspectionibus polypus reperto, satis *quasitum* esse pronunciaretur, & quid præterea in thorace, in ventre, in capite lateret, unde vteriores morbi & obitus discernerentur causa, perquirere negligeret. Nec minus damni indidem, nec raro, cepisse rem juridicam existimabis, cum apud iudices legeris polypum a medicis reum factum aliena culpa, eorum videlicet qui aut ense, aut fustibus, aut pernicioso pharmaco sanos valentesque homines occiderant, sive noxa his rebus illata intus appareret, sive postquam deprehensus erat

ad veras morborum causas indagandas ,
 quæque pravæ medendi rationis parens est
 & multorum malorum effetrix ; peto ve-
 niam si eundem locum urgeam , novisque
 rationibus & experimentis illustrare con-
 tendam .

Ac primum ad ea , quæ dicturus
 sum , ut animo accedas non repugnante ,
 liberoque ab insita jam ante menti in con-
 trarium opinione , quam maxime interest .
 Talem te præstabis si clarissimorum viro-
 rum auctoritate sententiam tuentium ad-
 versam , sed tamen potius exoptantium
 quam disserentium , te frangi non sinas ,
 meminerisque & nos qui veritatem inquiri-
 mus , & eos qui hanc se consecutos esse
 arbitrantur , esse homines , ut falli utrique
 humana conditione possimus . Deinde pro
 certo habeas non esse sanguinem morbo-



polypus , non esset diligenter quasita ec. De quodam audiui ,
 qui inter portenta a semetipso acta cordis polypi dissipa-
 tiones referebat , eratque jurare paratus . De senten-
 tia decessisset , si quæ Jo. Fantonus scripserat , perle-
 gisset : *Ex vitii pulsus* , ajebat Schol. obs. med. 27.
ne temere de morbis judicium feramus , cavendum . Sc-
ctio cadaverum cautiores efficiat . Polypos enim reperies ,
& aqualis & constans fuit pulsus ; polypi desunt , &
omne vitium fuit in pulsu .

rum fontem & causam quorumcunque omnium, quemadmodum post Harveum immortalis memoriæ Virum sanguinisque circuitus inventorem, fere quisque putat. Eoque libentius putat, quia ducto in numero caussarum sanguine, non solum faciliores morbi, quem tractet, explicatus habet, sed etiam in mortuorum corporibus quidquid fere sub oculos cadit, quod conjecturæ seu sententiæ circa ægritudinem antegressam prolata inservire possit, nullo negotio assumit, propriæque qualicunque pathologiæ adsciscit: quumque sanguis in cadaveribus sensibilior sit ens, & phænomena absque numero præseferat, sic ille frequentior stuporum motor est, facileque (inani equidem sæpe vanaque eloquentia) systemati cuicunque accomodatur.

Plurima conspiciuntur vasa plena confertaque sanguine sive affectæ partis, sive alterius, quæ habeat cum affecta cognationem; viscus item quodpiam sanguine turgidum, aut livens, quo se sanguis post mortem receperit naturali, ut supra dictum est, gravitatis motu. Ipsemet demum sanguis, qui niger & (a) atramenti



(a) Lieutaud, *lib. III. obs.* 247. & 375.

similis, picisque instar (a) nigerrimus ob
impeditum aeris accessum occurrit: quem
quidem alii (b) quasi adustum, alii (c)
appellant retorridum, quemque bilis atræ
sobolem æque veteres ac recentiores non-
nulli vocant, *morborumque melancholico-
rum* effectorem prædicant. Sed & is, qui
in mortuorum vasis concreverit, culpa sæ-
pe non vacat. Soletque in cadaverum in-
cisione (d) ita accurate recensiri, ut quasi

(a) Idem, *lib. II. obs.* 302. Atrum in utroque cordis ventriculo sanguinem, & picem ferme liquidam referentem Morgagnus memorat, *epist. IV. art.* 19. Idem sanguinem in corde non multum, nigrae picis similem semiliquatæ, recenset *epist. VIII. art.* 27. Distenta vasa cerebri piceo nigerrimo sanguine in melancholica vidit Swietenius apud eundem Morgagnum, *epist. cit. art.* 14.

(b) Idem *lib. cit.* Perantiqua est, nec tamen vetustate consumpta, *adusti sanguinis* mentio, ut quæ habetur apud Hippocratem, *de Morb. I. num. 14.* ea usum mireris Lancisium, qui *de Aneurysm. prop. 61. pag. 146.* nigerrimos grumos sanguinis in cystide aneurysmatica insidentes appellat aggregatum particularum sanguinis excoctarum, seu capita mortua &c. Vid. respons. ad id ipsum in secunda Pastæ epistola, quæ est *de Cordis Polyp. in dub. revoc. pag. 75.*

(c) Idem, *lib. cit. obs.* 602. Crassior item & faculentior dicitur apud eundem ipsum, *l. c. obs.* 80.

(d) *Salvus apud Lieutaudium, lib. II. obs. 482.* in aorta, & vena cava ita coactum vidit sanguinem ejusmodi, *ut apprehenso illius concreti uno principio totum*


quid habeat mirabile , cum potius qui non concreverit , is esset adnotandus . Quandoquidem longe sæpius concrescit , quam fluidus maneat tum sanguis qui e vena mittitur , tum qui in cadaverum vasis insidet ; neque majorem hunc firmita-

educeretur , aque ac gladius e vagina extrahi solet . Morgagnus similiter , *epist. XVIII. art. 30.* sanguinem , ait , non secus ac gladium e vagina fuisse e vena cava eductum ; nec non *epist. VII. art. 13.* e jugularibus venis . In cadaveribus variorum morbo cardiaco extinctorum , cor sanguine lento & coagulato plenissimum , non secus ac majora vasa , ita ut satis longa illius coagulati sanguinis frustra extrahi potuerint , legere licet apud Lieutaudium , *lib. cit. obs. 488.* Verumtamen non in his modo morbis , sed in aliis plerisque , in quibus solet sanguis vehementius concrescere , ut in pleuritide , angina , asthmate , phthisi , podagra , variolis , rheumaticis affectibus , febribusque cum inflammatione conjunctis , sanguis fere tanquam gladius e vagina e corde vasisque mortuorum educitur . Quin ex eorum etiam , qui eadem die , qua lethale vulnus acceperant , periire , corde vasisque satis longa sanguinis frustra haud semel extraximus , interdum quidem ex toto rubra , interdum alba in rubrum desinentia ; cum ceteroquin ante acceptum vulnus sani essent & bene valentes , ut pluries supralaudato Paulo Antonio Bianchi contigit vidisse & manu tractasse . Quin ipse mihi affirmavit , nullum ferme esse vas grande sanguiferum , in quo aliquando peregrinos mirosque grumos , varias figuras , & quasdam quasi habenulas referentes , non invenerit in indagandis cadaveribus , vel eorum qui mortiferæ externæ plagæ causa cito decessere .

tem, quam illum (a) adipisci cognovimus. Hæc omnia secundum naturam sunt, neque inter morborum causas ea reponas, ut infra dicendum.

§. XV.


Quo circa nec *attonitum morbum* quempiam ad (b) quietem quandam san-



(a) Ut rite grumus missi sanguinis cum eo confecturatur, qui in vasis mortuorum occurrit, non est sanguis, simulac concreverit in lagena, explorandus; tum quippe est mollior, utpote sero scatens, sed postmodum postquam serum emiseric, quod sensim quidem & pedetentim emittit. Sæpe vero admodum variat cum celeritas, qua serum expellitur, tum quantitas expulsi seri, ideoque etiam grumi firmitas, quippequæ ceteris paribus est in ratione tum celeritatis, qua serum exprimitur, tum quantitatis expressi seri. Utraque porro harum est in ratione virium attractricium, non earum tamen, qua rubri sanguinis globuli gaudent, ut Keilius putat, *de Secret. animal. tent. IV. pag. 48.* sed qua partes albæ sanguinis pollent, quæ scilicet Harveo, Senaco, & Petito auctoribus, sunt rubrorum globulorum sanguinis vinculum.

(b) Malpighius, *Posthum pag. 161.* Obstructis vel compressis arteriis tantummodo apoplexiam fieri, perperam opinatur Diemerbroechius, *Anat. cap. 10.* Idem sentit Malpighius, *loc. cit. pag. 27.* Etiam venis polypo, vel aliter impeditis, gigni ait eandem: interclusis enim arteriis, intercludi quoque censet nervei succi aditum in cerebri fistulas, & exporrectos nervos.


sanguineam & non sanguineam, pituitosam videlicet serosamve, cum a veteribus, tum ab insigni Boerrhavio positam, sapientibus aliis viris video fuisse probatam. Legimusque, ajente Morgagno (a) *negandum non esse, si ab aqua dumtaxat apoplexia sit* (a qua (b) esse posse verisimile est); *perinde esse hanc, atque ascitem per venæ sectionem velle curare*. Idem judicium est de morbo comitiali, de vertigine, de lethargo, capitisque aliis morbis generis ejusdem.



(a) *Epist. anat. med. IV. art. 14.*

(b) Probabiliter a sero in cerebro contracto non apoplexia modo potest fieri, sed etiam graves alii capitis morbi, si nimium acrius serum fuerit, aut copiosius, aut crassius, ut vasa cerebri ejusdemque fibras aut comprimat, aut obstruat, aut irriter. Fibrarum quoque laxitas ex diuturniore seri mora nasci potest, quæ apoplexium capitisque alios morbos creet; quemadmodum a fibrarum cordis laxitate syncopen interdum posse repeti, auctor est Morgagnus, *epist. XXV. art. 13.* Sæpius tamen serosa cerebri colluvies effectus est morbi; quod de sero cruento circa basin cranii reperto in puero bienni, morbo comitiali interdutiendum rapto, Lieutaud *lib. III. obs. 460.* & de seri copia in cerebri ventriculis & circa basin cerebri deprehensa in puero quinquenni, variolis interempto, apud eundem auctorem, *loc. cit. obs. 463.* affirmari potest.


Habentur apud gravissimum scriptorem Morgagnum (a) *apoplexiæ* exempla ex ingenti sanguinis disperditione profectæ; qualem ipsi quoque plus semel vidimus, immodicam sanguinis profusionem alias ex utero, alias ex hæmorrhoidibus consecutam, exangui ferme confectoque corpore. Quibus in casibus fibras cerebri nervorumque sic emoveri pervertique verisimile est, ut morbum hujusmodi concitent. Cujus vitii culpam nemo prudens in sanguinem conferet superfluentem in capite, aut retardatum, aut stagnantem, aut in id ipsum incitatori motu delatum; sed rectius in ejusdem inopiam, cujus caussa tollitur *æquilibrium* inter sanguinis molem, & vasorum diametrum; eoque sublato, quemadmodum ex sanguinis fluxu ita nervos affici cernimus ut (b) *singultus*, *delirium*, *nervorum distentio*, *animi defectio*, modo seorsim, modo simul incidant; sic *morbus attonitus* incidat non est cur miremur. Nervorum enim, cerebrique morbos non raro invicem permutari observamus, ut



(a) *Epist. IV. art. 5. & alibi.*

(b) Hipp. V. *Aphor. 3. 56. VII. 9.*

melancholici (a) fiant epileptici ; & hi vicissim melancholici . Sæpeque videre licet melancholicos itidem (quorum morbum maxima ex parte in nervorum cerebrique vitio consistere probabiliter credimus) aut in apoplexiam delabi , aut in nervorum distentionem , aut in furorem , aut in cæcitatem ; ut jure locum hic habeat illud veterum effatum (b) : *Morborum unam eandemque esse causam , locum autem differentiam facere* . Non iidem videlicet morbi perpetuo sanguinis profusionem sequuntur , quia irritatio , quæ ex ea nascitur , fibrarum cerebri nervorumque , non eadem semper est ; & si est , tamen non easdem semper fibras occupat , sed alias aliasque , easque potissimum , quæ sint morbo aut natura debiliores . Attamen non desunt (quod sane dolendum) qui in curatione *apoplexiæ* ex longa multaque sanguinis profusione ortæ , jam extenuato confectoque ferme ægrotante , sanguinem mittere non dubitent , partim falsis opinionibus ducti , partim ignara multitudine permoti ,



(a) Idem , *Popul. morb.* VI. 8. 95.

(b) Idem *de Flatib. num.* 4.

quæ eum damnat qui sanguinem in eo morbo ducere prætermiserit, in quo mitti nullo habito discrimine eum semper debere stultissime putat.

§. XVI.

Denique non ignorandum tam *attoniti morbi*, quam *comitialis*, *vertiginis*, *capitis doloris*, *lethargi*, *syncopis*, *nervorum distentionis*, *spirandi difficultatis*, aliorumque hujus generis morborum, causas perpetuo non apparere in mortuorum corporibus. Nam cerebri nervorumque vitia, unde hujusmodi morbi persæpe nascuntur, plerumque (a) sub aspectum, ta-



(a) Vitia cerebri nervorumque, quorum est sedes in eorundem fibris, plane perfecteque cognosci non posse propter ipsarum earundem exilitatem, putat eximius Whytt: *Les Vap. tom. I. part. 2. pag. 365. Et pag. 566.* hæc habet: *Quoiqu' il paroisse, par l'ouverture du cadavre de beaucoup de ceux, qui sont morts des maux de nerfs, que l'estomac, les intestins, le foie, la rate, l'epiploon, la mesentere ou la matrice se trouvent obstrues, squirreux, ou attaqués d'un autre mal, néanmoins, comme dans un grand nombre d'autres gens morts des memes maladies, l'examen de ces viscères n'a fait voir aucune trace de semblables vices, il est permis de conclure, que les symptomes nerveux*

Atumque non cadunt . Quocirca graviter
& præclare Ballonius vir experientissimus
(a) : *Multi convulsi sunt pavoribus consternati , phrenitide , apoplexia , epilepsia sublati , lethargicis affectibus oppressi , in quibus (b) nullum fere vestigium mali a-*

peuvent venir fort souvent de causes qui , n' etant pas sensibles pour nos organes , ne peuvent etre decouvertes par l'ouverture des cadavres . Morgagnus quoque , *epist. XXIV. art. 29.* docuit : Cerebri nervorumque offensiones sensum plerumque fugere . Imo perpetuo fugere credendum est eas , quas idem colendus Auctor , *epist. VIII. art. 32.* posuit in *mutatione cerebri , nervorumque invisibili* . Quocirca is idem , *epist. XXVI. art. 36.* causam convulsivæ lethalisque tussis *invisibilem* latere existimat posse in *nerveo quopiam ganglio* . Quâ probabiliter ratione ea latuerat , quæ puerulum exercuit interemitque , in cujus inciso corpore *pulmones farti tecti* , & *vitio quovis immunes apparuere* , adnotante Willisio , *de morb. convuls. cap. 12.* Nullum similiter apparuisse legimus apud insignem Lancisium , *de sub. mort. lib. I. cap. 11.* *sensibilis læsionis vestigium* in cordis nervis , qui in quodam cane ita arcte a Valsalva constricti fuerant ad jugulum , ut quamvis illico solverentur , paucos post dies , æque ac si fuissent amputati , decesserit animal .

(a) *II. Conf. lib. comm. hist. I.*

(b) Præter aquæ paucillum in ventriculis cerebri (qua ii fere non carent , *Act. Erud. Lips. 1715. Aug. pag. 342.*) nihil in eo prorsus vitii , neque in cerebello , neque in medulla oblongata invenit Morgagnus in cadavere apoplecticæ , Lieutaud , *lib. III. obs. 395. pag. 238. seq.*

perto cranio inventum est; nec sanguis, nec aqua, nec ichor, quamquam medici, qui historiam morbi vidissent, & lethifera symptomata observassent, certo affirmarent, se aut inter membranas, aut in cavitatibus, aut alia in parte abscessum, aut sanguinis, aut aquæ copiam deprehensuros Ut tanto cautiorem prudentioremque medicum esse oporteat, & in investigandis rerum causis diligentiores, quanto res sunt abditiores, occultioresque, & sæpius de spe sua deciderit. Adeo obscura est morborum capitalium ratio, & evolutio difficilis. Curatio quoque non minore difficultate est involuta &c. Pro ratione porro morborum capitalium, ut modo scripsit auctor, capitis morborum sedem intelligas velim. Nam caussa efficiens perraro elucere consuevit (a) vel in iis morbis, quo-



(a) Assentiri vix possumus Malpighio, nimis sane festinanter scribenti, *Op. posth. pag. 228. Anatomien morborum sedem indicare, & originem, causam, & generandi modum. Utinam hæc præstaret Anatome. Fatemur cum Tulpio, Obs. III. cap. 31. eam esse Medicis necessariam: verum in medicina tribunal, cum Bodgano, Obs. anat. III. apud Lyserum, Cult. anat. pag. 263. catenus eam esse concedimus, quo ad conjecturæ, quam de morbi sede fecimus, aut eventum,*

tum, præcordiorum anxietatem, quæ juvenculam sustulerant, præstantissimo Hænio observante (a), in cujus inciso cadavere vitalia viscera sanitatem illibatam adeo referebant, ut nihil illibatius. Postremo nec allatum a Malpighio (b) asthmatici casum prætermiserim, cujus corpus scalpello patefactum nullum in pulmonibus vitium, sed in mesenterio magnarum glandularum copiam exhibuit.

Ex quo apparet, non quodpiam asthma ab humorum in pulmonibus congestu esse repetendum, ut cum Halesio (c) & Floyero plerique arbitrantur. Et enim sæpe hujus caussa morbi ex Willisii opinione (d) absque phlegmate, aut humore viscoso pulmonibus, ut vulgo creditur, impacto, intra nervorum genus subsistit; idque anatomica Needhami observatione confirmatur hujusmodi (e): *Cadaver apertum asthmatici in ipso paroxysmo extincti, exhibuit viscera omnia sana, præsertim*



(a) Apud Lieutaud lib. II. obs. 611.

(b) Op. posthum. pag. 177. seq.

(c) Hæmastatiq. pag. 75. num. 16. seq.


(d) De morb. convuls. cap. 12.

(e) Apud eundem l. c.

pulmones, neque aut excrementi in bronchiis collecti, aut sanguinis in vasis restagnantis ulla indicia prodita sunt. Hoc unum accidit, quod vesica fellea calculos quamplures in se continuit. Cetera vel generi nervoso affecto tribuenda sunt, vel causæ nobis ignotæ, certe oculis non conspicuæ: Ut merito a convulsione nervorum, consentiente Malpighio (a), musculorumque intercostalium, & diaphragmatis, natum fuisse morbum existimemus.

§. XVII.


Quibus cognitis si nihil præter concretum sanguinem in vasis mortuorum videris, nihil præter polypos in iisdem vasis cordeque genitos, non his acquiescas oportet, sed si quid usquam vitii in cadavere occurrat, quod morbum facere potuerit, studiose ac diligenter inquiras. Neque ubi hujus nihil appareat, illico *polypum* inculpaveris, aut congestum concretumve in corde vasisque sanguinem, vulgari vitiosoque eorum more, qui res ante oculos po-



(a) *Op. cit. pag. 245.*

sitas tantummodo intuentur, nihil altum suspiciant, nihil occultum abditumque cogitant. Non enim coire sanguinem in vivorum vasis, inque grumum polypumque verti probabile est; ut si in corde vasisque sanguiferis offenderis polypum, velim ortum post mortem, his rationibus adducaris, ut credas.

Enimvero, si quia sanguis in aneurysmate retardatur, iccirco in eo nasci polypus vel sanguinea strues creditur, non video cur hæc fere occurrat in corde inque majoribus vasis, in quibus multo celerior est sanguinis motus, non occurrat in minoribus, in quibus esse dicitur (a) tardior. Neque putes ideo polypum fere in corde vasorumque truncis gigni, quod pars alba sanguinis, ex qua conflatur,



(a) Commune ac contritum est physiologorum dogma, sanguinem multo segnius in minoribus vasis ferri, quam in majoribus. Eo plus enim credunt sanguinis velocitatem minui, quo vasorum cava simul sumpta plus increscunt, quo plus augetur numerus vasorum, & quo longius a corde vasa absunt. Ideoque magnus Hallerus: *Vulgo consentitur minori in minimis vasis, quam in truncis celeritate sanguinem circumferri; & in universum in minimis vasis tanto minorem superare, quanto quævis arteriola minima est, & a corde remotior.* Physiol. lib. VI. sect. 1. §. 28.

nisi in magnis caveis non secedat a rubra, ut post Senacum (a) arbitratur Haenius (b); aut quia eadem pars alba sanguinis cordis irretiatur lacertulis, seque se in ejus cryptas & fossulas inserat (c).

Nam ad primum quod attinet, verum quidem est, pleuriticorum, e. g. sanguinem, qui plerumque crusta alba tegi solet, nullo obduci albo cortice si tantulus sit, ut vix lagenæ fundum obtingat; secus eo non vacare, si duorum triumve digitorum altitudinem æquet; in cyatho tamen figuram habente coni inversi, satis est ad edendam crustam ut sanguis altitudinem æquet digiti. Ratio non liquet, sed effectum videmus. Non est par ratio vasorum in humano corpore, quorum alia propius, alia longius ab horizonte absunt, & plura pluribus dant, accipiuntque sanguinem: ut cum post mortem naturali is gravitate in prona defluerit in iisque quieverit, pars ipsius



(a) De Corde *lib. III. cap. 4. num. 12.*

(b) Rat. med. *part. II. cap. 7.*

(c) Vid. §. extremum nostri Scripti in notis, ubi Lieutaudii sententia ad id spectans refertur.

(b) Ratio cur sanguis e vena ductus, qui vix fundum lagenæ tegat, albo cortice non obducitur, fortasse esse potest, quod in tantillo sanguine, videlicet in tantilla altitudine, quam obtinet in lagena pars ejus rubra non tantum comprimitur, quantum necesse est, ut partem albam, quæ minus premi solet, sursum propellat ad cruoris superficiem. *Fluidi* namque *consistentis natura*, ut ait eximius Borellus, de Mot. grav. proposit. 10. pag. m. 28. *requirit ut partium ejus æque jacentium magis compressæ sursum impellant partes minus pressas perpendiculariter ad horizontem*. Probabiliter etiam in animalium corporibus, si sanguis statim post mortem, priusquam concreseat, in minori quopiam vase intercludi sic posset, quod sit horizonti parallelum, ut nullum cum sanguine reliquorum vasorum ei esset commercium, album in coeundo corticem non ederet, quia perpaucula moles esset sanguinis, ut pars ejusdem alba urgeri a rubra posset per lineas horizonti perpendiculares, seu inferioris vasis lateri, quod posuimus esse horizonti parallelum, perinde uti misso usuvenit sanguini, qui vix lagenæ fundum velet.

quaquam vero diametro parallelas , ubi brevi tempore soliditatem acquirit . Cujus quidem rei fidem faciunt polyposæ concrectiones , quas sæpe æque in corde vasisque majoribus , ac in crassioris meningis sinibus , eorundemque ramis quibusdam & finibus , itemque in plexus choroidei vasculis , in hypogastricis , ac pudendis , aliisque ejusmodi cernimus , in quibus gigni nequaquam deberent , si pars alba sanguinis nequiret se a rubra secernere .

Quod vero ad secundum attinet , polypus perpetuo cordis (a) non cohæret la-



(a) Polyposam concrectionem in sinistro cordis ventriculo undequaque solutam Morgagnus attulit *epist. XXXVIII. art. 12.* In sinistro itidem cordis ventriculo *massam fibrosam pinguedinem referentem nulla parte adnatam , sed liberam* Winchlerus reperit , *Miscell. curios. ann. 1671.* In dextero ventriculo *frustum carneum oblongum , sed nusquam adnexum ;* in sinistro autem ventriculo *pinguedinem item liberam* deprehendit Borrichius , *Act. med. Thom. Barthol a. 1774. seqq.* Nul- las polyposas concrectiones in corde , sed tantum in truncis vasorum animadvertit Morgagnus , *epist. XXXV. art. 12.* Fluctuantes in corde polypos ex *Act. Berolin.* Senacus refert *lib. IV. cap. 11. §. 2.* Neque plurimi facit præclarissimus Jo. Fantonus , *Schol. obs. 1. pag. 2. ad ortum polypi in corde hujus ejusdem lacertulos , fossulas , valvularum fibrillas &c. quod putet facilis in aneurysmate quam in corde gigni polypum debere .*

tero ventriculo , quia cum capacior sit , plus sanguinis continet , ideoque plus etiam albi corticis , postquam post mortem concreverit . Etenim corticis ejusdem albi crassitudo quantitati respondet cruoris . Præter hæc est etiam sinus is dexter cordis multo minus , quam sinister , tum laceratus tum crassus . Facilius igitur dilatabitur , ut qui minus resistat tum sanguini naturali gravitate post mortem delato , tum ei qui partium imi ventris pondere , supinoque corpore , sursum impelli in inferiorem cavam solet .



subalbo colore esse propter chyli , lymphæque adjunctionem : *atro* vero , qui a sinistris . Sed chylo & lymphæ additis albidior non fieri dexteri ventriculi polypum , nec sinistri obscuriorem , observationes evincunt ab A. Pasta allatæ in *epist. de cord. polyp. ec. pag. 58. seq.* Eo enim plus albicant tum concretiones polyposæ , tum cortex missi sanguinis , quo minus coercuerint , alligaverintque rubrorum globulorum , & quo plus sanguis alba parte scateat ; nam corporis lymphæ ferme est expers coloris , & serum sanguinis utriusque ventriculi cordis , & cujuslibet alius partis nonnihil tantummodo flavescere solet .

Porro major aut minor sive polypi , sive crustæ sanguinis missi firmitas non est a majori , aut minori seri quantitate , sed a majori minorique vi , qua pars alba sanguinis seu in crustam , seu in polypum versa serum expellit in horum corporum areolis interceptum .


§. XVIII.

Postremo si egressos e corde polypos, inque majora vasa exporrectos inspexeris, facili negotio intelliges eos ipsos post mortem fuisse concretos. Quandoquidem eorundem vasorum majorum ostia, in quibus insidere vides polypos, cordis vicissim claudunt & reserant valvulæ. Eoque facilius intelliges si animadverteris, ejusmodi polypos teretes ubique, tornatos, æqualesque esse; nihil habere ad cordis valvulas lacunosum, nihil extans, nihil inæquale, nihil omnino, quod ullius valvularum earundem nisus offensionisque ostendat indicium. Quod utique magno argumento esse potest, id temporis tantummodo generatos fuisse polypos, cum valvulæ cordis extremo casu conciderint, iterque sanguini naturali gravitate delato patefecerint.

§. XIX.

Interea quæ de polyporum ortu post mortem jam pridem A. Pasta scripserat, si forte legerit (ut valde probabiliter legit),


non moverunt Hallerum (a) ; Morgagnum vero sic , ut funditus quidem tollere noluerit polypos , sed quos veros induxit ,



(a) Certe tantum virum non videntur movisse : nam postquam , *lib. V. sect. 1. §. 9.* plura adduxerit , ut probet cogi sanguinem in vasis viventium ; ejusdemque *coagula* , *loc. cit. §. 10. polyporum nomine venire* dixerit , polyposque adeo frequenter occurrere , ut *absque iis fere nullum cadaver reperiatur* ; continuo paragraphum XI. inscribit , *de polypis veris* , ut jure dubites , an egerit præcedenti (quod non videtur) de falsis . Et si de falsis , haud scimus , quandonam orti : post ne , an ante mortem . Quod si ante mortem , quæri potest , num multo ante , an in vitæ limine . Si primum , erunt polypi veri , non falsi ; & quidem tales , ut nulla eos signa comitentur , quod omni probabilitate caret , licet hæc habeat Auctor , *loc. cit. §. 10.* his verbis : *hi sunt polypi in corde magnisque vasis reperi* , quos nullum ante mortem symptoma præcessit : Sin secundum , vehementer dubitaverim an sit veritati consentaneum , nisi observata me fallunt , polypum in superiori sanguinis coacti sede perpetuo deprehendi , ratione habita positus corporis , in quo mortuus est homo . Quod idem ipsum misso usu venit sanguini , qui in lagena concreverit , cujus superiorem sedem albus cortex , seu pars alba sanguinis sibi vindicat , rubra vero inferiorem . Hoc autem constanter & perpetuo non videtur nisi ei sanguini accidere posse , qui post mortem in pronis vasorum sedibus conquieverit , in quas propria gravitate nititur tum scilicet , cum vires cordis vasorumque , quibus urgetur , aut ex toto fuerint deletæ , aut a vi superatæ , quæ sanguinem , quemadmodum gravia quæque , nisi quid impediat , deorsum trahit .

eos putet esse rarissimos . Utriusque rationes afferam; his ipse, salva semper talium tantorumque virorum auctoritate, reponam meas . Vera ne sint, an inania, quæ ipsi ad polypos defendendos proferunt, quæ ego ad oppugnandos subjiciam, cum non tam rationes, quam experimenta in contrarias partes distrahantur, penes ætatem, quæ obscura promit, judicium esto . Affert uterque percelebris experimenta Lancisii, quibus polypum in ligatis canum arteriis ostenderit gigni; sed A. Pastæ experimenta, quæ sunt Lancisianis contraria, alter silet, alter (a) sic adducit, ut non iis quidem fidem deroget, sed Lancisianis paulo post allatis, his fere tum suas ipsius, tum plerasque clarissimi Valsalvæ observationes, quibus aneurysmatis polypos potissimum sustinet, confirmare conatur . Uterque insuper præstantissimi Petiti observata commemorat: quibus tamen, ut mea fert opinio, non tollitur dubitatio, qua perdifficilis quæstio de Polypis continetur .

Ad ea igitur, quæ est Lancisius expertus, nihil habeo respondere, nisi eum



(a) Morgagnus, *epist.* XVII. art. 29.

& Præceptore meo , & me fuisse felicior-
rem . Nam quod ipsi contigit vidisse , &
quidem sæpe , idem Præcepteri , & mihi
ne semel quidem adhuc obtigit , quam-
quam non uni nec semel , sed sæpe &
pluribus canibus vivis alteram cruralium ar-
riarum posteriorum filo cupreo (nam li-
neum , quamvis ceratum , aut dentibus
commotum priores canes contriverant ,
aut pus vulneris ichorque consumpserat)
arctissime constrinxerim , meorum laborum
collegis D. Aloysio Venantio Medico exi-
miæ intellectus aciei , ac Paulo Antonio
Bianchi experto doctoque Chirurgo supra
relatis §. 1. notis . Nullum enim polypum ,
nec concretionem ullam sanguinis in arte-
ria citra vincturam incisa & diligenter in-
specta , vivente cane , sed integrum per-
petuo fluidumque sanguinem reperi . Si
cui plus fortunæ , aut dexteritatis fuerit
in experiendo , ut quæ Lancisius se ait
esse consecutum , assequatur ; simul ac
certior factus fuero , de sententia dece-
dam ; sin minus in pristina permanebo ,
in meisque ipsis experimentis acquiescam .
Satis quippe pertæsum est fatidæ canum
custodiæ , eorundemque latratuum .


Cum mihi porro fortuna non respon-

[illegible]

(b) Hydraulicæ quidem & hydrostaticæ rationes polyporum adhæſioni vasorum lateribus, in quibus insident, favere videntur. At polypi nunquam vasorum adhærent fere parietibus. Humiditas enim, qua eadem madent, adhæſionem prohibet, eo prorsus modo, quo sanguis missus, postquam concreverit, lagenæ non adhæret parietibus, si antea fuerint aqua madefacti. Vasis vero sanguiferis, quamvis humore perfusis, alba pars sanguinis sæpe manet infixa, si aspera fuerint, si cryptis, fossulis, aut foraminibus sateant. In hæc enim priusquam concreſcat, se se infert liquidæ ceræ instar, cordisque lacertos & valvularum tendines ita sæpe circumplicat, ut avelli postquam induerit, sine laceratione non possit. Id porro plane liquet. Nam si bovillo corde modo extracto pleuritici sanguinem excipias, crusta ejus alba non aliter cordis parietibus adhærebit, atque in cadaveribus solet, & fibrillas quoque valvularum implicabit, colligabitque (ut post animadversionem Morgagni, *epist. XXIV. art. 30.* sum plus semel expertus) modo cor ita colles, dum sanguinem excipis, ut pars alba sanguinis, quæ secedit a rubra, ad valvulas usque pertineat. Si denique pleuriticorum cadavera frequenter incideris, non dubito, quin tibi sæpe occurrant polypi, quales

te aneurysmatibus , vel sacci formam habentibus , enormibusque cordis vasorumque sanguiferorum dilatationibus , orificiorumque constrictionibus , polypi sæpius non apparuere (ut jam pridem ostendit Pasta in *Epist. cit. de cord. polyp. pag. 49. 50. 51. 52. 53.* & infra pluribus etiam ipse confirmabo) cum apparere omnino debuissent ex modo allata Lancisii sententia : quippe in ægrotantibus ex vitio hujusmodi adjungeretur ad stagnandum fluidi proclivitas , ut idem sentit . Quod si quando in aneurysmate polypus aut in cavis cordis , aut in ejusdem auriculis , ut aliis in vasis sive integris , sive depravatis occurrat , hunc si accurate & perquam diligenter , ut supra dictum est , inspexeris , nequaquam ut plurimum cavum invenies , aut non ubique cavum , nec talem profecto , qualem leges hydraulicæ postulant , & sanguinis aditus ac progressus requirit .

Doctissimum vero Petitum , (a) non *polypum* , ut inquit Morgagnus (b) *fere perfectum* , & absolutum in eorum arteria of-



(a) Petit , *Memoir. de l' Acad. Royal.* 1731.

(b) *Epist. XVII. art. 29.*


fendisse reor, quibus amputatum fuerat femur, sed (a) pyramidatum sanguinis grumum. Quid porro sanguinis grumis (b) frequentius in corporibus mortuorum? nihil namque affert, quo (c) probet pyra-

(a) Pyramidata grumi forma figuram exprimebat arteriæ, in qua sanguis concreverat : quod utique perpetuo accidit, cum videlicet sanguis totum vas impleat, quod occupat, priusquam vertatur in grumum. Pyramidatam porro formam dedit arteriæ fascia qua femur devincebatur, priusquam resecaretur. Polypi similiter figuram receptaculi, in quo gignuntur, referunt, si pars alba sanguinis tanta fuerit, ut totum receptaculum oppleat, antequam concresecat. Et quamvis deinceps polypi pedetentim extenuentur, sero, quo scatent, sensim expresso, durioresque fiant ; formam tamen quam induerant, gracilescentia non amittunt. Quo circa miror, Hallerum ratum, *Physiol. lib. V. sect. 1. §. 11. A.* Pastam locutum ad Roncallum fuisse, *Roncall. epist. pag. 263.* de polypis in vivis, redditis tenacioribus, *expressa fluidiori parte*, cum verba ibi fecerit de iis, qui generantur post mortem.

(b) Vid. §. III. & §. XV. textu, notisque.

(c) Quin ex ejusdem doctrina probari posse videtur contrarium. Nam cum scripserit, *Memoir. de l'Acad. R. 1732. sanguine in vasis insistente, albam ejus partem a rubra secedere, & seorsim cogi*; id silet in mutilatis grumo usuvenire. Ex quo aut sanguis in mutilatis non insistit, aut si insistit, alba ejus pars non secedit a rubra, nec seorsim concrescit, sed utraque copulatur post mortem, ut saepius contingit. *In momentanea sanguinis quiete*, aiebat item Haenius, *Rat. med. part. II. cap. 7. materia alba sanguinis suum nifum sequitur, ut in educto sanguine*. Verumta-

midatum illum grumum sanguinis ortum
fuisse homine vivente, sed sistendo tan-
tum sanguini mirifice congruere, ingeniose



men utriusque sententiæ devinctarum arteriarum exempla repugnans, quæ Morgagnus protulit, *epist. XIX. art. 24. 25. 26.* Immo ne concreescere quidem, ut post Malpighium, *Op. posth. pag. 14.* Hallerus putat, facile crediderim; nunquam enim in devinctis vasis, ut sæpe sæpius expertus sum, concretum eundem vidi. Quin neque perpetuo concreescit in cadaverum vasis, ut observata testantur Morgagni. Siquidem is tantum concreescit, cujus pars alba ejusmodi fuerit, ut soliditatem eidem valeat impartire. Immotum pariter, nec tamen probabiliter coactum, eundem fuisse ex ejusdem ipsius Halleri experimentis disci potest, *Memoir. I. pag. 66. & 157.* tum etiam *exper. 155. 163. 167. 170. 177.* Contra semper concreescit, qui concreescendi vim habeat, si vasorum motus, quibus continetur, ex toto extinguatur. Hinc a morte cogitur ob delectam vim cordis, vasorumque. Cogitur similiter in vasis gangræna tentatis, si ea mortua fuerint & computrescere ceperint. Quæ vero sic est pars corporis emortua, ut arte queat, aut natura restitui, veluti cum multa nive oblecta reviviscit, quæ frigore obri-guerat mortuæ speciem præbens, sanguinem in ea concrevisse ægerrime affirmaverim. Non enim probabile videtur, partem quampiam corporis restitui, si sanguis concretus jam est, neque hunc eundem in motum cieri nivis accessur. Quoniam qui calente aqua e vena incisa excipitur, frigida affusa, citius in fibras albamque quasi lanuginem coalescit. Eadem ratione si sanguis factus erat trombolus in aneurysmate spurio a Ruyschio proposito, *Obs. anat. 2. pag. 4.* credibiliter is arteriæ tractus, quemadmodum brachium, gangræna fuerat correptus.

magis quam probabiliter putat , dum resectam arteriam cunei instar eo censeat obturari . Cujus hæc sunt verba : *Forma grumi , qualem ipse describo , perfecte videtur in eorum fere trunco , qui post duos usque ad viginti , aut ad triginta ab amputatione dies decessere . Arteriam ipse cruralem Academiæ tradidi hominis , cui fæmur quindecim ante dies exsectum fuerat , & cujus inspicere figura potest .*

Non desunt , pergit idem , (a) in gangrænæ curatione amputationum sanæ partis exempla incruentorum propter vasa grumo sanguinis obturata . Quandoquidem non semper grumus intra fines consistit vitiatæ partis , sed interdum penetrat usque ad inflammata . Utinam Auctor clarissimus se grumum dixisset vidisse in vivorum corporibus arterias affectæ partis occupantem , sanguinisque transitum prohibentem . Qui usque dum in viventibus non occurrat , maneo in sententia , reorque polyposas concreciones non esse inflammationis causas , sive adsit , sive absit gangræna :



(a) Memoir. de l'Acad. R. 1732.

quemadmodum (a) non esse pleuritidis ,
me plane docuit mortuorum incisio .

Neque porro affirmaverim , dum
quodpiam membrum præciditur , sangui-
nem grumo sisti polyposo intra vasa geni-
to , sed vasorum vincitura , quam dexter-
rimus Paræus protulit , aut instrumento
tourniquet appellato , quod proposuit Mo-
rellus . Hæc sane sunt (b) , non grumus



(a) Pleuritidem in obstructione vasorum consiste-
re , pulmones adeuntium , Malpighius existimat , de
cord. polyp. apud Manget. Biblioth. anat. tom. II.
pag. 123. his verbis : *Pleuritides , uno verbo , ultra
acutam febrem sunt polyposæ concretiones in pulmonibus ,
ut ex cadaveribus & extracto sanguine apparet ; idque
cum Malpighio quisque , puto , vel jurejurando affir-
maret . Se tamen in errore versari facile intelliget ,
modo si eorum corpora inciderit , quos supino corpo-
re pleuritis sustulit . Cernet quippe partem sanguinis
polyposam , aut , si mavis , polypos , in arteriæ venæ-
que pulmonaris truncis ramisque insidentes majoribus ,
rubram vero partem sanguinis in eorundem extremita-
tibus ; secus atque Malpighius credidit , Posth. pag. 176.
& vulgo putatur : ut ex ejusdem polyposæ substantiæ ,
aut polyporum sede , siquidem in vivente homine ,
quod mehercle non arbitror , polypi istiusmodi gene-
rentur , sint cordis potius , quam pulmonum morbi
expectandi .*

(b) Petitus *loc. cit. pag. 315. Vincitura* enim , ut
idem ait , *Memoir. 1731. pag. 126. sanguinem sistit ,
vas constringendo , & occludendo , quemadmodum liga-
mine saccum comprimimus .*

guinis, quæ a rubra intra arterias secedat, easque indurescens obturet. Non enim duarum harum partium alteram ab altera disjungi, & aut seorsim concreescere, aut in unum coire consuevit, nisi vasorum pressu nisuque sublato, quorum quidem quasi partes sanguinis invicem permiscantur, ejusdemque fluxio bellissime conservatur.

Ex quo, puto, efficitur, ut neque polyposas concretiones in ligatis canum arteriis unquam viderim, neque ex brachii venis arctissime deligati sanguinem ferri, ut quidam censent, aut grumosum, aut ad funis modum vasculum percutientem, aut cum frustulis permixtum polyposis, vel in ipsis pleuriticis, quorum missus sanguis crassiori firmiorique cortice solet tegi, quapropter suspicari non desino, cum sanguinem legimus e vena apoplectici educi nequivisse, non ideo nequivisse quia fuerit concretus in venis, aut quia fuerit vena grumo sanguinis obturata, vel polypo; sed quia summa cutis tantum lacerata, vena non fuerit incisa. *Ægre* porro credide-



que omnino necesse est, remedio esset sanguinis profusioni.

rim , qui ex incisiss venis extracti recensentur polypi, eos revera polypos fuisse , quales e vasis mortuorum (a) sæpissime educimus ; maluerimque , si quando *polypiformia* hujusmodi corpuscula intueri contigerit , ea aut in pinguedinis quæpiam frustula , aut in concreciones effusi sub cute sanguinis , aut fortasse etiam in vermes reponere , non venarum , ut Borellus (b) , alique putant , sed cutis incolas .

§. XX.

Rem itaque maxime dubiam , quamvis a Galeno (c) , Græcisque antiquioribus traditam (d) , sanguinis concrecionem in



(a) Haller. *Physiol. lib. V. sect. 1. §. 10.*

(b) *Centur. III. obs. 4. pag. 199. seq.*

(c) Fomentis utebatur frictionibusque Galenus ad dissolvendu in attonitis sanguinem , quem arbitrabatur fuisse concretum in vasis , *de rat. vict. class. 7. pag. 27.* Longeque ante eum apud Hipp. *lib. de Morb. sacr. num. 10.* syderatio ducebatur a sanguine , quem pituita coagulasset .

(d) Pituita frigida sanguinem , *coagulat* , Hipp. *de Vict. acut. num. 39.* Idem *de Morb. I. num. 22.* & *II. num. 28.* Idem *de Morb. sacr. num. 8. 9. 10.* Atra item bile sanguinem coagulari legimus apud eundem *de Morb. II. num. 6.* Frigidæ pituitæ opinio , ejusque

vasis viventium , qua (a) perfacile explicari evolviſque morbi queant , pro certa atque explorata habuiſſe videtur is , qui (b) ſcripſerat *ſanguinem a frigore extremorum , & aeris ambientis gelari , & ſpiritibus , ut in mortuis , deſtitui* . Frigore coagulatum ſanguinem haud ſemel ſe viſiſſe fatetur Leeuwenhoeckius (c) ; nec in priſtinum curſum reſtitui caloris ope , ſed cordis arteriarumque motu revocato , obſervavit Senacus (d) in ranis . At enim


ſanguinis coagulandi potestas ad noſtra ferme tempora pervenit , ut Carolus Piſo vir ceteroquin doctiſſimus , *Obſer. ſect. 2. part. 2. cap. 4.* affirmare non dubitaverit , ſe ſanguinis concretionem , ſive congelationem in vasis capitis obſervare *a frigore aquæ in eo ſtagnantis plurimæ* ; quaſi aquæ illud frigus in cerebro contractæ ſenſibus exploraret , dum homo viveret , eumque deprehendiſſet ejuſmodi , ut vim vaſorum omnem extingueret valeret , unde ſanguis coagularetur .

(a) Explicari æque poteſt morbus , quem a ſanguine ducendum eſſe conjicias , ſi eundem repetas ab ipſo *ſanguine in vaſis* retardato & non ingrediente velut ſolebat , *Hipp. de Morb. ſacr. num. 8.* aut ab ejuſdem ſanguinis inſtitutione , *idem de Flat. num. 15.* aut ab inæquali ejuſdem ipſius traditu , *idem lib. cit. num. 21.* aut demum a multa ejuſdem ſanguinis coſervatione in vasis , *idem lib. cit. num. 12.*

(b) Harveus *de Mot. cord. & ſang. cap. 15. pag. m. 165. ſeq.*

(c) Continuat. Arcan. natur. pag. 129.


(d) *Lib. III. cap. 4. num. 13.*



tum ; nec concretum nisi in iis , qui per initia febris , urgente videlicet frigore , fuere sublati . Quorum sane neutrum puto facili negotio ostendi posse . Harveus , credo , cum veteribus censuit , Hipp. *de morb. I. num. 22.* alique post eum , febris frigore cogi sanguinem , solvique subsequenti calore . Cæli certe frigore non coagulatur insectorum sanguis , nec piscium gelidissimis in aquis . Suppetunt quoque exempla sanguinis in hominibus rigidi apud Morgagnum , *epist. XLIX. art. 28.* nec propterea coagulati . At demus hunc frigore sive febris , sive aeris coagulari ; ecquo , scire velim , calore dissolvetur ? nam calor interdum eundem coagulat , æque ac frigus , auctore Senaco , *lib. III. cap. 4. num. 12.* quamvis mox idem auctor asserat , nunquam intus in corpore tantum esse calorem , ut coagulet sanguinem secus quam de Sauvages existimat , *Diff. sur la caus. de la Fievre, chap. 6.*

Densiolem tamen in febrientibus sanguinem agnoscit Senacus , *loc. cit.* magisque divisioni resistentem ; quod video confirmatum ab Hallero , *lib. V. sect. 2. §. 7.* Non igitur verisimile est , febris calore extenuari sanguinem , solvique frigore concretum . Febris calorem ad sanguinem coagulandum tendere , existimat Hales , *Hæmastat. pag. 87. natural. mque* iccirco sanguinis motum , atque adeo vasorum magnopere augere , ne idem coaguletur . Et sane vasorum pulsui vim grummos sanguinis dissolvendi adscribit Senacus , *loc. cit. num. 4.* is idem (mirabile) qui num. 12. hæc habet : Quo fortior est vasorum ictus , eo est sanguis ad coagulationem proclivior . Similiter apud Hallerum legimus , *loc. cit. §. 8.* quo robustior homo fuerit , eo sanguinis concretio est celerior & durior : & *Memoir. I. pag. 111.* Concretiones sanguinis in vasis viribus cordis , quæ supra modum fuerint , fieri duriores . Quibus prævit Harveus

non dissipari, sanguinisque demum missi crustam (a) sæpe adeo coriaceæ esse indolis, ut vix dividi scalpello queat, & vix destrui malleo.




sticum, membranarum speciem interdum præbens retiformium, quod non caloris minus vim, quam cordis, arteriarumque eludit nifus. At idem ipse, loc. cit. cap. 3. num. 4. vidit frigore coactum ranarum sanguinem, dissolutum fuisse restituta vi cordis. Si igitur concretio sanguinis vi solvitur cordis, qui fit, ut vis eadem cordis concretionis ortui non officiat? Secus ea ipsa vi cordis aucta, sanguineque vehementius ad vasorum latera alliso, secedere a rubra, cogique partem albam, ait, sanguinis, loc. cit. cap. 4. num. 12. æque ac si quis bacillo hunc quasset; quamvis is idem censeat, l. c. num. 13. motu vasorum effici quominus lymphæ (rectius pars alba sanguinis) separetur a ceteris partibus: talemque motum permixtionis partium sanguinis cunctarum causam esse principem. Et postquam dixerit, loc. cit. ad sanguinis concretionem plurimum conferre vasorum inertiam; vasorum inertia, quam affert syncope, quaque horis aliquot vis ferme cordis extinguitur, sæpe sanguinem non censet concreescere. Ita fluctuemus & vacillemus oportet, ipsique a nobis quodammodo dissideamus, si cordis polypos grumosque sanguinis in viventium vasis sustinere placet.

(a) Haller. *lib. V. sect. 1. §. 8.* Missus sanguis in massam pene tendineam abiit, *apud eundem, loc. cit. §. 9.* Phlogisticam crustam sanguinis vix transcindi novacula adnotat item Haenius, *Rat. med. part. II. cap. 7.* Crustam missi sanguinis adeo tenacem, & sectioni resistantem affert Morgagnus, *epist. XLIX. art. 22.* ut vix ac ne vix quidem scindi potuerit.

Cum igitur minime verisimile sit, dissolvi cordis palpitatione polypum, natum in syncope, ut sibi persuadet Swietenius (a), nec calore aucto sanguinis, ut modo dictum est, sequitur, ut & qui febris frigore gignuntur polypi, maneant necesse sit usque ad extremum vitæ diem (quemadmodum de nonnullis eorum arbitratur Swietenius); & si qui permanserint, quod non equidem arbitror, saltem rarissimos eos dicant, & sine signis incidentes polyporum. Ullum enim post febrilia frigora his signis affici, quis unquam viderit? quorum defectu, quomodo iidem polypi asserendi?

§. XXI.

Quid nunc dicendum de polypis, qui *cæli* creduntur *frigore* creari, qui *animi defectione*, qui (b) *timore*, *mærore*,



(a) Comm. in Boerrhaav. tom. I. pag. 684. & II. pag. 175.

(b) Terrore, dolore, mæroreve accedente, aortam, arteriamque dilatari pulmonarem, in iisque insistere ac coagulari sanguinem, opinatur Senæus, lib. cit.

Accedit Hallerum eundem, *loc. cit.* post de Sauvages, *Diff. sur l'inflamm. num.* 145. *pag.* 267. & Senacum, *lib. cit. cap.* 8. *num.* 8. censuisse sanguinis missione cordis vires minui; ex quo & sanguinis motum, qui cordis respondet viribus. Unde venæ sectionis emanat utilitas ad febres, & ad sanguinis profusionem, eodem auctore *loc. cit. & pag.* 112. non tamen puto omnes, sed quos sanguinis redundantia parit, aut impetus. Demum ex ipsius Halleri experimentis, quæ legi queunt, *loc. cit. pag.* 112. 118. 119. & *exper.* 193. *num.* 7. itemque ex iis quæ Senacus protulit, *lib. III. cap.* 6. *num.* 7. (quamvis ab Hallerianis, *pag.* 112. adductis dissentiant) evinci potest, vires cordis venæ sectione minui, sanguinemque retardari, modo ne vasa nimia plenitudine laboraverint. Deinde vel in ipsis ranis non modo sanguis retardatur in vasis, dum e venæ aut arteriæ vulnere fluere desiit, sed etiam dum adhuc effluit; quod tum ejusdem concretio indicat, qua vulnus creditur obturari, *Haller. loc. cit. pag.* 112, 116. & passim alibi, tum membranarum arteriosarum contractio, quam idem Hallerus, *loc. cit. pag.* 117. vi mortuæ tribuit, ut qui vivam (haud scio an merito) insectorum vasis deneget, *exper.* 66. 75. 76. 81. 120. 132. 147. *num.* 5. In homine quoque pluries sanguinem idem ait suppressi, *lib. cit. pag.* 105. e vena ductum, vulnere non obligato. Quod accidere videtur posse, quum vim sanguinis non tantum vis superet cohesionis, qua sanguinis



sum nism sequatur , nec sanguis solidescat . Siquidem observationes extant , eæque haud paucæ , apud accuratissimum Morgagnum universi sanguinis in cadaveribus fluidi , ut patet ex indice pererudito ejusdem Operi præposito *Visorum in cadaveribus* , voc. *sanguis fluidus* . Scilicet sanguis talis omnino in mortuorum vasisprehenditur , qualis e venis viventium fuerit ductus . Nimirum is in lagna si haudquaquam concreverit , manet itidem in cadaveribus fluidus ; in ea si coiverit , in his pariter occurrit coactus , Si crustam missus ante mortem edidit , polypos etiam gignit in mortuis . Quæ tamen ut constant , tum sanguis iis legibus mitatur oportet , quibus mittendum docuit *Pasta* , *Epist. de Cord. polyp. num. XV. pag. 61. seq.* tum aliquot horas immotum sinas cadaver , necesse est . Sapientissimo Hallero , *lib. V. sect. 1. §. 11.* caussa polypi videtur ponenda in *aliqua sanguinis in vivo animale quiete , quæcumque ejus quietis causa fuerit* ; binæque *A. Pastæ* scripta citat , ut Lectoribus videri queat Hallerianæ assensus opinioni , atque hoc pacto aperte secum pugnans , quippe qui polypos in vivis refellere studeat , eorumque ortum tantummodo , qui mortem subsequuntur , explicare . Pastam porro aliter non fuisse opinatum , non video , non modo in indicatis ab auctore locis , sed nusquam alibi : eique est condonandum , si in tanta rerum , auctorumque ubertate non potuit singula , qua solebat , diligentia recognoscere .

(b) Adde, in animi defectione longa vehementique, in hystericis suffocationibus pertinacissimis, quæ persæpe occurrunt, & in quibus cordis arteriarumque motus si ex toto non deletur (ut perperam quidam putant) certe non percipitur, si polypum velis gigni, quo, quæso, pacto, temporis puncto (nam tantillo temporis spatio homo solet restitui) eundem solvi, dissiparique existimas posse? sin minus, non video

Quocirca quoties legi apud Hallerum, *lib. cit. sect. 2. §. 7.* de grumo illo effusi sanguinis ex præcipiti casu ab alto contracti in cellulosis musculorum ossiumque intervallis, pondere unciarum duodecim, putrefactionis ope fuisse dissolutum, sanguinisque orbis restitutum; toties mecum ipse cogitavi, an tumor ille, magnitudine quasi caput alterum æquans, ad id tumorum genus referri posset, qui non e sanguine gignuntur effuso, sed ex arcuata distentione fibrarum,

creati , qui horas aliquot voraginibus fuer-
re submersi , ex iisque extracti perfrigidi ;
quomodo tot (b) cardiacis , tot hystericis


quique non ad magna modo vulnera accedunt , ut in-
quit Hippocrates , V. Aphor. 66. *Si in vulneribus fori-
bus , & pravis , tumor non appareat , ingens malum ,*
verum etiam contusiones , & fracturas , quæ magnæ
fuerint , solent subsequi . Unde & faciei quoque color
peti potest Ætiopis similis , cujusmodi haud semel ipse
viderim ortum præcipue sub oculos , vicinasque partes
ex ingenti capitis dolore , qui sine ullo tumore exer-
cebat hystericas , quique eodem prorsus modo sensim
fuerit dissipatus : nam tumori , quem effusus sanguis
concitatur , scalpello fere succurritur , incidique scrotum
jubeat Celsus , lib. VII. cap. 19. *si quando in id sanguis
defluxit , aliquidve concretum ex eo decidit.*

(a) In longis animi defectionibus sanguinem ali-
quando non concrecere , neque in iis , qui horas
quatuor , quinque , & plures etiam fuere submersi ,
opinatur Senacus Op. cit. , idque tum fortasse accide-
re reor , cum homines e morbo recreati protinus con-
valescunt . Quod si pereant syncope , aut aquis mo-
riantur submersi , polypique seu in corde , seu in vaso-
rum truncis insideant , qualescunque fuerint & quo-
quo modo fabrefacti , ecquis est qui ad animi defectionem ,
qui ad aquarum ingulationem ortum non revo-
cet eorundem ? Tantum sæpe in rebus medicis sensus ,
quos fere consulimus , iisque in caussarum efficientium
perquisitione primas deferimus , nobis illudunt !

(b) Defunctas & mortuis adscriptas mulieres ali-
quando revixisse , Lancisius comperit , *de Subit. mort.*
lib. I. cap. 13. Hystericas plurimas mortuis similes
post triduum revixisse narrat Ballonius , *Consil. lib. I.*
pag. 132. Willisius , *de Apopl. cap. 8. pag. 197.* in
nonnullis , inquit , *post magnam in occipite gravitatem*

aliisque morbis tentati, in quibus dies aliquot, ne dum horas, tantum fuerit deleta vis cordis, quomodo, inquam, fuerint restituti, convaluerintque obstructo corde polypis, vasorumque truncis hujusmodi corporibus impeditis.

Cumque exteriores partes & a corde remotiores multo magis frigus, quam interiores occupet, quid est, quod polypi, frigoris orti magnitudine, non in extremorum vasis, sed in cavis cordis, vasorumque truncis occurrant? Quæ sane argumento esse queunt, nec pertenui quidem, ut acutissimo Listero assentiamur affirman-




*anima deliquium, cum repentina functionum omnium animalium privatione, succedere, in quo laborantes immoti, & insensiles, cum pulsu & respiratione valde diminutis, & vix perceptibilibus, & per totum frigescentes, per plures horas, imo diem saepe unum aut alterum mortuis similiores, quam vivis, decumbunt. Novimus interdum taliter affectos, cum frigescentes, atque pulsu & respiratione penitus aboleri visis, obrigescerent, pro defunctis vere habitos fuisse, atque cista ferali impositos, tandem post duas, aut tres dies revixisse. „ Hominum denum, qui biduo, triduo, quatriduo pro mortuis habiti sunt immensam „ se ait „ vim collegisse „ eruditissimus Hallerus, *Physiol. tom. II. pag. 15. addend. ad tom. I. pag. 332.**

ti (a) post Philosophum (b) : *Humores nuspiam in toto sanguinis orbe corporari , non in arteriis venisque : & quemadmodum sanguinis globuli semper iidem sunt , ita serum per se nuspiam coagulatur , cohæretque , ipseque adeo sanguis æternus liquor est : dummodo , addixerim , non effundatur .*

§. XXII.


Scio fore non paucos , qui modo alato Listeri loco adversentur , eorum fulti observationibus , qui sanguinem ex arteria supra vincturæ locum pertusa viderint exivisse concretum ; qui eundem in insectorum vasculis coactumprehenderint , inque ranarum aneurysmatibus viventium , sive ipsis per se ortis , sive scalpello exciatis ; in umbilicalibus item arteriis ; ad oras pariter vulnerum ; intus similiter in corde ; inque vasis demum sanguiferis , quo sanguinis prohiberetur effluxus . Non



(a) De Humor. cap. 40. pag. 318.

(b) De Partib. animal. lib. I. cap. 5,

quet, vasa ne introspexerint, dum viveret animal, an postquam perierit. Ut plurimum enim, ut alias diximus, coagulum offendimus sanguinem in vasis mortuorum. Ceterum sanguis vinculis interclusus, e trunco transibat in proximos arteriæ ramos, observante Schewenkeo (a), sæpe *sanguinem diutule in motum intra venas ita devinctas, ut fluere ac refluxere nequeat*, haudquaquam concreescere Thomas Cornelius prodidit (b). Demus tamen sanguinem injectis duobus cuipiam seu venæ seu arteriæ vinculis conclusum, stagnantem, non quassatum, nec aditum in truncum ullum vasorum aut ramos habentem, cogi in vasis viventium, & perpetuo quidem; quid tum? nisi si probaveris, quod est probatu difficile, nullo similiter impulsu agitari, nullo prorsus motu cieri, nullum huc illuc aditum habere sanguinem, qui in arteriis solutis ac liberis, qui in dilatatis cavis cordis, qui in



rias... sanguinem invenies tanta copia effluentem, quantum arteria capacitas comprehendere potest; ubi ne verbum quidem de eisdem concretionibus.

(a) De Hematolog. pag. 80.

(b) Progymn. VII. pag. 125.

varicibus , qui in aneurysmatibus , inque saccis (a) continetur eorundem .

Extrinsecus porro venis , arteriisque adnatus pertusis (b) is erat grumus , quo




(a) Nunquam enim intercipitur sanguis in aneurysmatis sacco , sed continenter in hunc ex pertusa fluit arteria , & ex eo ipso vicissim in arteriam fluit .

(b) *Pars materia lymphatica* , docente Hallero exper. 20. num. 5. *ex incisis venis exit* , & concretum gignit circa oras vulneris , quo ejusdem obturamentum munitur , ex acervo globulorum rubrorum conflato . Videantur quoque ejusdem *experimenta* 167. 180. 183. 234. & pag. 287. & 303. Alibi materiam silet lymphaticam , & grumulum tantummodo incisa vasa obturantem nominat , ex rubrorum globulorum congerie confectum , uti *exper.* 160. 161. 162. 163. 193. Est tamen ubi albam concretionem sæpe a se visam ait auctor , *exper.* 180. intus in incisa vena , per quam sibi aditum aperirent globuli , quoad eadem dissiparetur . Tale quidpiam sibi visus est vidisse Leeuwenhoechius , ut infra dicetur . Sed concretiones , quæ sunt ejusmodi ut trajiciantur a globulis ab iisque solvantur , aut liquefiant & diffundantur calore accensæ candelæ , *Haller. exper.* 6. & 7. abhorrent a sanguinis concretionibus , quas quotidie cernimus , e vena ducti , aut in cava corporis effusi : ut quis merito dubitet , an hi duo Viri præstantissimi , alique post eos , non veram exquisitamque sanguinis concretionem , sed speciem tantummodo concretionis viderint : quo nomine vel ipse eam appellat Hallerus , *exper.* 58. quæ cursu sanguinis , aut *exper.* 155. quæ venæ sectionis ope dissolvebatur .

Dubitare item quis poterit , certum ne sit occludi arteriæ vulnus liquore quopiam coagulato , ut idem

fluxum sanguinis fuisse sublatum, pluri-



ait, *Memoir. I. pag. 116.* an sanguinem suppressi arteriæ contractionem, credere liceat, ut is idem innuit *lib. cit. pag. 117.* Arteriæ vulnus alia etiam ratione potest claudi, contractionem nimirum ejusdem membranarum, quam is ipse auctor vi tribuit mortuæ: de qua pariter contractionem videtur locutus *exper. 102. num. 4.* Quamvis tamen vitalem, seu muscularem contractionem vasorum insectis denegat, *exper. 20. 101. 102. 120. 132. 147. 198. 200.* itemque *Memoir. I. pag. 84. & 141.* necnon *II. pag. 307.* Et quamvis vulnus venæ hiare dixerit *exper. 179. & 192.* eandemque esse arteriæ diametrum sanguine refertæ atque exinanitæ, *exper. 86. & 102. num. 6.*; dubitandi tamen ansam præbet non modo analogiæ ratio, ducta ab animalibus sanguine calidis, sed etiam auctor ipse, qui *exper. 91.* scriptum reliquit; *Arterias sæpe in ranis quamplurimum pallere experimentorum initio*, earumque diametrum maxime minui, ut hæ eadem globulorum filo pertenui pateant, donec sensim amplificentur, & sanguine impleantur. Libenter sane eo in casu vitalem arteriarum contractionem agnoverim sive bestiarum illarum metu, sive dolore commotam; facile namque est intellectu, quemadmodum vis nervosa ad musculosas arteriarum fibras accedens, eas incitare, & reprimere valeat: itemque & contrahere, & extendere, tensasque etiam & immobiles reddere: ut ejus similiter impulsu queat effici, quominus considat arteria sanguinis expers, idem *exper. 86.* nisi fortasse aut aere, aut invisibili quopiam liquore (quo de vid. Haller. *exper. 93.*) fuerit expleta. Collabi tamen vasorum parietes, simul ac iis sanguis subducitur, Leeuwenhoeck. *Epist. physiol. pag. 406.* fere solent, nisi in os fuerint, aut cartilaginem versi.

Quod vero ad venæ arteriæque hiatum pertinet, nisi si ostenderis sic plagam patere, ut ad cavum ea-

Læ, quæ non raro ex utero, interdum ex vesica, stomacho, pulmonibus aut seorsim, aut una prodeunt cum effuso sanguine. Ex quo merito dubitaverim, quem polypum fuisse e vasis sanguiferis ductum (cujus extractione sanguinis profluvium renovaretur) est opinatus Petitus (a), an ejusmodi caruncula fuerit polypiformis, ex albo cortice effusi concretique sanguinis conflata ad (b) tendinis robur, & figuram accedens. Fere namque usuvenit, suppressum sanguinem, si quid hujus ejusdem concreti prope vulnus evellas, aut si vulnus, oras explorando, irrites,


aut si quid emortuæ partis auferas , aut
si vel id , cui vulnus insidet , dimoveas
pertractesque , iterum provocari .

Neque facile adducar , ut assentiar , grumum sanguinis , quo cordis vasorumque vulnera (a) obturata proferuntur , sedem in corde habuisse , vasisque sanguiferis . Perrupto enim corde , continuo sanguis in pericardium effunditur , ibique concrescens , ita adhærere potest vulneri , ut id ipsum occludat . Disrupto item incisoque aneurysmate , aut varice , aut arteria quapiam , aut vena , illico sanguis aut sub cute , aut in cavis corporis , aut in musculorum intervallis contrahitur , subindeque coactus vasorum vulnera sæpe claudit . Arteriarum vero tractus , qui se in ligamentum verterint sive ob canalıs colligationem , sive ex rerum ordine , ut in arteriis umbilicalibus , inque ductu arterioso , non modo nunquam mihi visus sum videre , quod intus sanguinem foverent concretum , sed ne vestigium quidem ullum



(a) Sancapanus, *obs.* 44. apud Haller. *Physiol. lib.*
V. sect. 1. §. 9. Item Platnerus *Instit. Chirur.* §. 406.
pag. 144.

sanguinis, sive rubræ ejusdem, sive albæ partis præferrent. Semperque sum suspicatus, quod ut primum exinaniantur arteriæ, compulso retro sanguine, qui pergere nequeat aut per devinctas arterias, ut in experimentis Emeti (a), nostrisque (b), aut vi naturæ per ductum arteriosum, perque umbilicales arterias (valde probabiliter post ortum nascentium ordine inverso contractas), statim concidant vasorum eorundem tunicæ, partiumque circumsitaram pressu & arctius coeant, & viscosum succum quempiam sive per poros inorganicos, sive per exhalantium ductuum ora emittant, quo ipsæ eadem tunicæ penitus glutinentur, & ferruminentur in ligamentum. Qua, puto, ratione, & quibus, ni fallor, albis fortibusque vinculis, haudquaquam ex concreto sanguine conflatis, in morbis (c) præsertim longis, pulmonem pleuræ arctissime conjunctum cernimus, in-




(a) Apud Haller, *Memoir. I. cap. 3. pag. 44.*

(b) Vidi plus semel arteriam cruralem in canibus, quam arctissime constrinxeram, coalitam & solidatam supra vinculum: interdum vidi perviam quidem, sed minus capacem usque ad ramorum exortum,

(c) Pozzi, *Epist. anat. pag. 69.*

terdumque (a) pulmonem diaphragmati ;
cordi pericardium , peritonæo hepar , vin-
ctaque inter se (b) pleraque imi ventris
viscera .

Quæ porro a Leeuwenhoechio de sanguinis concretione afferuntur in viventium insectorum vasis deprehensa, talia meo quidem arbitrato non sunt, ut iis sine ulla hæsitatione, aut dubitatione assentiamur. Non enim auctor percelebris ulla exquisita ratione concludit, nec suis satis experimentis, ni fallor, probat, eum sanguinem fuisse concretum, quem sibi persuadet fuisse. Nam si concretum putat sanguinem, quia sine motu deprehenderit, non video, quamobrem sanguinis institio ejusdem credatur coagulatio; sin quia sanguinis non distinguerentur particulæ, id ob globulorum acervum potest contingere: nec tamen quia globuli coacervantur, iccirco cohærent inter se, ut grumum efficiant. Siquidem hunc (c) a parte alba



sanguinis , qua globuli vinciuntur rubri ,
 ortum ducere , certo constat . Atque par-
 tem hanc albam *fibrosam densioremque*
 sanguinis , quæ *reliquarum est vinculum* ,
 Harveo (a) , & re ipsa testibus , non ines-
 se vivo sanguini (ei nimirum , qui e cor-
 de per vasa in omne corpus diffunditur ,
 indeque ad cor redit) , idem putat Har-
 veus : quasi velit dicere eximius ille vir ,
 id , quo sanguis cogitur & soliditatem ac-
 quirat , non ante oriri , aut certe vim coa-
 gulandi sanguinis nancisci , quam idem
 sanguis effundatur e vasis , aut vitam ami-
 serit animal .

§. XXIII.

Restat , ut ad experimenta respon-
 deamus , quibus sibi inquit (b) constitisse
 Hallerus , sæpe sanguinem in ranarum a-
 neurysmatibus concrevisse . Cum autem id
 pene toties accidisse scripserit , quoties a-
 neurysma introspexerit , rationi consenta-
 neum est (si modo collatio inter ranam



(a) *De Generat. Animal. exercit. 57. pag. m. 292.*


(b) *Memoir. I. chap. 3. pag. 55.*

& hominem locum habet) ut in humanorum quoque corporum aneurysmatibus fere polyposæ innascantur concretiones. Quoniam vero futurum est, ut exemplis infra afferendis ostendam, pleraque humanorum corporum aneurysmata eisdem concretionibus caruisse; concludi probabiliter potest aut speciem tantummodo polyposæ concretionis, non polyposam concretionem, fuisse ab Hallero deprehensam, aut non respondere in hominibus, quæ ipse observarat (a) in ranis, aliisque ejusdem speciei animantibus, collationemque adeo,



(a) Habentur aliquot concretionum exempla, *Memoir. I. pag. 62. & Exper. 92. 97. 180.* Dubium tamen utrum eæ fuerint expressæ sanguinis concretiones, an tantummodo adumbratæ quædam imagines earundem, ad id concretionis genus referendæ, quam simpliciore auctor nominat *Memoir. I. pag. 55.* probabiliter ab eo positam in globulorum consistentium acervo, *Exper. 80. 101.* quibus complebatur aneurysma, *Exper. 82. & 96.* Quo videtur referenda tum *species* illa concretionis allata, *Exper. 88.* tum ea quæ albescere dicitur, *Exper. 180.* quarum utramque series aliquot rubrorum globulorum easdem pervadentium dissiparunt. Nam difficile est intellectu grumum sanguinis, qui ab alba parte sibi robur & soliditatem asciscit, & sola putrefactione dissolvitur, filis nonnullis globulorum comminui dissiparique posse, præsertim

Pudet me dicere , quid sentiam , ne videar summo Viro adversari . Quædam tamen , non pugnandi animo , sed veri inquirendi causa , dicere aggrediar , de quibus dubitem . In his igitur , quæ ex Morgagno adduximus , dubitatio esse potest . Etenim si in aneurysmate decem , exempli gratia , aut viginti , aut triginta annorum nullo negotio polypus nascitur , in eo pariter nasci videtur posse , quod unius tantum fuerit , aut duorum , aut trium . Non enim hydraulicæ & hydrostaticæ leges infinitam , puto , temporis diuturnitatem postulant , ut partes sanguinis a se invicem sejungantur , cum nisu ac pondere sint inter se adeo dispares . Ex quo si in animalium corporibus sic leges non complentur hydraulicæ & hydrostaticæ , ut partes sanguinis a se invicem discedentes polypum creent majori parte aneurysmatum , ut exemplis infra afferendis palam fiet , neque in minori eorundem




partes dividi , cogique scribit Petitus , Memoir. de l' Acad. R. a. 1732. quamvis non probet , nec facile probasset , omnino non moveri sanguinem in vasis vinculo interclusum ; nec satis probet , ut alias diximus , in eisdem cogi interceptum .

parte compleri verisimile est, etiamsi expleta saturataque annis fuerint.

Neque minus dubia videntur, quæ idem auctor gravissimus habet de polypi natura, & crustæ albæ sanguinis. Se namque vidisse, ait (a) polyposas nonnullas concretiones colore quodam lurido, nedum obsoleto, substantia autem præter modum exsucca, ut quanto magis, inquit, ab iis discrepant omnibus, quas in cordis ventriculis unquam viderim, tanto magis significant, non se, ut has novissime produci, quippe non ut hæc, sanguinis similes, qui unquam mihi se obtulerit, postquam pridie in vitreo vase concrevisset, examinandum, sed non longe aliter ad tactum aspectumque se habentes.

Dubitandi ansam præbet Marcellus Malpighius polyporum æque propugnator, ac crustæ albæ sanguinis scrutator solertissimus, qui (b) pluribus luculenter ostendit nihil interesse inter polypum, & albam crustam sanguinis: quibus præclarissi-




(a) *Loc. cit.*

(b) Dissert. de Cord. Polyp. apud Manget. Biblioth. anat. tom. II. part. 2. pag. 120

Tum enim pellucet, sanguisque, qui ei subjacet, niger alienum reddit colorem, fereque (a) ex cæruleo lividum: qualem in varicibus cernimus, in venisque in eum artuum pertinentibus, itemque in iis quæ viscera in mortuis adeunt, nisi si sanguine careant; in cordis demum valvulis, quibus itidem sanguis subsit niger. Quod si crassitudo fuerit inæqualis, nec eadem ubique densitas atque compactio cum sanguinis crustæ, tum polyposarum concretionum, varius & fœdus ex subiecto sanguine earundem color apparebit.

Neque vero, pergit idem Doctor gravissimus (b), pro vario cadaverum positu invenire solitus sum (concretiones hujusmodi polyposas) in unam aliquam, modo hanc, modo illam plagam, sed immoto etiam cadavere circumundique locatas, & adhærentes. Ea mihi verba, pro vario cadaverum positu; itemque illa, immoto




(a) Ob hanc causam non sine cautione ea legem, quæ Hallerus habet de sanguine inquiens lib. V. sect. 1. §. 7. *Quando ad malum habitum inclinatur, pars magna sanguinis in album, & subcæruleum coagulum abit*: quippe potest talis color nasci albæ crustæ interjectu pellucidæ.

(b) *Epist. XXVII. art. 9.*

etiam cadavere, non tantum videntur perspicua, quantum rei pondus momentumque, qua de agitur, requirit. Quocirca ut eorum veritas eluceat, quæ in *Epistola de Cordis polypo* protulit A. Pasta ad ejusdem polypi, polyposarumque concrectionum sedem illustrandam, non tam positum cadaveris, quam hominis morientis positum, qui saltem per horam ab interitu servetur, attendas necesse est, ut (a) rectius de sede polypi, polyposarumve concrectionum conjecturam facias. Has siquidem perpetuo sitas in superioribus vasorum sedibus reperies, nunquam in pronis. Cum enim in has sanguis, homine mortuo, naturali gravitate feratur, in iisque consistat, ita mox in partes dividitur, ut quæ albæ, seu polyposæ fuerint, supra disponantur, subter vero rubræ,

quippe graviores polyposis : ut non aliter considerandus sit sanguis in corde vasisque cadaverum , atque is qui continetur in vitro missus e vena . Hic si crustam edit in lagena , ille quoque in cavis cordis inque sanguiferis mortuorum vasis eandem ipsam , nisi impediatur , excitat , cum eo tamen ut semper cortex ille albus sanguinis editiorem (a) grumi sedem occupet cum in lagena , tum in sanguiferis cadaverum receptaculis ; nihilque inter utramque crustam interest , nisi quod in lagena figuram planam ; globosam , aut fornicatam in cordis ventriculis & auriculis , inque aneurysmatibus nanciscatur ; teretem in venis , arteriisque exprimat . Ex quo efficitur , ut polyposas in aneurysmate concrectiones , quas invenisse Morgagnus se ait esse solitum , ut modo diximus , bifa-



(a) Per grumi sedem nolim intelligas id sanguinis quod fortuito intercipitur polyposa parte , ut in polypos cavorum cordis , & aneurysmatum usuvenit , sed totum illum qui polypo subjacet , pronasque vasorum sedes occupat , sive concretus fuerit , sive fluidus manserit . Ex eo quippe secedit pars ejusdem polyposa & in superiori sede consistens cogitur , & polypi , polyposarumve concrectionum nomine decoratur , qualemcumque demum formam figuramque sumat .

riam considerare possimus : uno modo , cum earum respicimus situm , quem occupant ; altero , cum figuram formamque quam habent . Situm earum perpetuo equidem deprehendi , qualem in albo cortice missi sanguinis , summum videlicet in grumo , collatione facta ad vasorum iter seu pronum , seu acclive , corporis positioni respondens , in qua homo interiit , & in qua post interitum immotus horam unam , quod minimum sit , manserit . Figura vero & imago earundem , qualiscunque fuerit , non efficit , quominus eadem ipsæ partem rubram sanguinis , quæ maxima sit , subter se habeant , cujus utique descensui non modo ortum suum debent , sed etiam dignitatem loci , quod in grumi , seu partis rubræ vestigio concrecant .

Interdum tamen accidit (& frequentius quidem in cordis caveis , inque ejusdem auriculis & aneurysmatibus , quam in arteriis venisque , diametrum quæ secundum naturam est servantibus) , ut quamvis a massa sanguinea in vasis reside polypus fiat ; tamen non tota pars sanguinis rubra infra polypum sita cernatur , sed ejusdem aliquantulum intra polyposam substantiam sive corticibus instructam , sive

horum expertem interjiciatur , interdum etiam sic in ejus media parte contrahatur , ut qui polypum ante mortem sustinent natum , perforatum ad aditum sanguini præbendum esse contendant . Cujus quidem rei causam , ut tot aliarum , ignorare me fateor . Rarissimum tamen est quod polyposo corpore intus (a) undique aneurysma vestiatur , aut cavum quodpiam aliud sanguinis receptaculum : & si quando vestitur , nondum (omni asseveratione affirmaverim) ejusmodi mihi se obtulit , ut per eum sanguis transire posse videretur (b) .


Ceterum quot unquam vidi polypos , & quot in locis vidi , totidem ut plurimum vidi figuram vasorum referentes , in quibus concreverant , si modo tanti fue-



(a) In magnis aneurysmatibus , vel sacci formam habentibus *inveniri quendam veluti fornicem polyposogrumosum* tradit Lancisius de Aneurysm. prop. 61. pag. 145. & locupletissimus de Haller lib. VI, sect. 1. §. 15. inquit : *Iu meis experimentis , & in cl. virorum adnotationibus aneurysmata fere fornice polyposo , & grumoso obducuntur .*

(b) Confer ea quæ de polypis cavis exaravit insignis A. Pasta in Epist. de polyp. cord. num. XXIV. pag. 75. seq.

rint , ut totum vas implerent ; sin minus modo (a) placentæ , modo (b) carnis concavæ seu fornicatæ , modo figuram nanciſcuntur aliam aliamque . Quocirca experientiſſimus Bodganus (c) cum viderit e ſanguine in muſculorum intervallis coercito , quo ex diſrupto aneurysmate ſpurio defluxerat , confectam ejusmodi concretionem polypoſam , nec quid eſſet , plane ſciret , his eam verbis expreſſit : *Videbatur maſſa carnea , pondere viginti unciarum , cordis ſimilis , corticata , & fibroſa , cavum intus habens cordis thalamo iidem ſimile , cum octo columnis , uncisſque tribus*




(a) Hinc perperam miratum mirari licet Wepferum , qui diſſ. de Apoplex. pag. m. 390. quod *ſanguinis ſuperficiem polypoſa corpora non operirent* . Nam niſi dixeris quot in corde , inque ejusdem auriculis offenderis polypos , totidem veros eſſe polypos , totidem vi morbi procreatos , confitearis necesse erit , in horum cavitatibus figuram polypi eſſe perpetuo aut globosam , aut fornicatam , nunquam planam , quemadmodum cernimus in vitro album corticem parti rubræ ſanguinis ſuperſtratum . In vasis non dilatatis figuram polyporum teretem ut plurimum deprehendimus .

(b) *Carnis concava ſpeciem præbent polypi aliquando in cordis ventriculis , agente Morgagno epiſt. XXIV. art. 30.*

(c) *Obſ. anat. Chir. VIII. apud Liſeri Cultr. anat. pag. 272.*

concreti sanguinis. Quot figuras, quot formas speciesque non habent polyposæ quædam concretiones, quæ ex utero sæpe prodeunt in mensium lochiõrumque profluvio? ut si membranarum, quibus sepiuntur, compositionem scrutari velis, si mirabilem fibrarum ductum atque contextum, si incredibilem denique earundem fabricam, teneri vix poteris, quin putes, id effici non posse sine sentientis naturæ solertia; cum tamen re ipsa constet, nisi me plura experimenta fallunt, eo prorsus modo hujusmodi corpora fabricari, temporisque eo prorsus spatio, quo in mortuorum vasis polypi gignuntur, & crusta missi sanguinis in lagena; & quamvis figura sæpe differant, unam tamen eandemque esse albæ crustæ sanguinis, ac polyposarum concretionum uteri naturam; unam eandemque harum utrarumque atque polyporum cordis, vasorumque sanguiferorum.


Quid? si Morgagnus partem quandam polypi osseam viderit (a) aneurysma obsidentis supra iliacarum exortum. Nihil



(a) *Epist. XXXVII. art. 40.*

riore aortæ facie ossea illa squama intercipi comprehendique potuit parte alba sanguinis, atque una concreescere post gibberæ anus interitum. Potuit demum etiam osseæ eidem squamæ firmitus adhærere polyposa concretio, quam (a) squama arteriæ membranæ, ut ea ipsa simul cum polyposa concretionem extraheretur, putareturque esse pars polypi.

Eadem fieri conjectura potest de polypo, quem tendineum Panarolus (b), & Peclinus (c) se vidisse affirmarunt, quem osseum Senacus (d), quem lapidi similem Snellus (e), quem conversum in mate-



(a) Adnotat idem, *epist. XXVI. 11.* vel ex ipsis vertebra vitiatas *magnam osseam squamam ab ipsis nullo negotio fuisse detractam*. Pariterque is idem scribit, *epist. XXI. 47. internam aortæ aneurysmatis substantiam nonnullis in locis laxam adeo fuisse, ut ex ea squamula nullo negotio avelli possent.*

(b) Pentecost. II. obs. 11. Hanc historiam Lancisius proposuit, de *Aneurysm. prop. 38.* quam & Pasta notavit, *Ep. de cord. polyp. pag. 33. seq.* His cl. Macoppii polypum addiderim aortæ aneurysma occupantem, quem *tendinosus principis* auctor exornat, *tendinosque quibusdam vinculis*, *Epist. de Aortæ polyp. LVI. p. 72.*

(c) Haller. *lib. V. sect. 1. §. 11. not. (c).*

(d) Idem loc. allegato.

(e) Idem ibidem.

riam lapideam Valentinus (a), & si quem demum alius in adamantinam protulerit mutatum.

§. XXIV.


Quocirca duo hæc si memineris, quorum primum est: polypum, qui cordis dicitur, polyposasve concrectiones hujusmodi quaslibet nihil firmitate, nihil substantia, nihil structura differre a crusta alba missi sanguinis; alterum, cordis eundem polypum, polyposasque concrectiones omnes, ubicunque fuerint, nisi cadaveris concussu volutione aut incisione depellantur, superiorem perpetuo grumi sedem obtinere, pars vero rubra sanguinis inferiorem; si hæc, inquam, memineris, plura expedies, quæ aliter solvi non facile queant.

Multo tamen pluris valet ad perobscuram difficilemque solvendam de polypis quæstionem, polypi situm novisse, quem sibi perpetuo constanterque in grumo vindicat, quam substantiæ similitudi-



(a) Apud Senacum *lib. IV. cap. 10. num. 4.*


nem inter polypum & crustam albam sanguinis . Polypi situm visus est attigisse Petitus , Vir ingenio prope singulari , quum inquit (a) : *interdum substantiæ hæ duæ (nimirum alba & rubra sanguinis) seorsim concrefcere cernuntur , & tum grumum partim album , partim rubrum conficiunt ; ut pars alba sanguinis , quæ levior est , supra rubram locetur , dummodo cadaver , ut plerumque accidit , in positione horizontali moriatur , donec frigescat .* Id ipsum me docuit mortuorum incisio , cui annos ferme sex in Nosocomio huic nostro , & alibi Provinciæ ex jussu Magistratus Sanitatis , operam dedi ; ægrotantium morbos , horumque signa notando atque animadvertendo , eorumque quot interierant , tot secando , postquam , qui interdum moriebantur , ferme omnium positum attendissem , qualis fuerit extremo spiritu , & horam amplius ab interitu , quo rectius con-



(a) Memoir. de l'Acad. R. de l'an. 1722. pag. m. 542. Consentit cl. Petito Patavii P. P. *epist. XXIV. art. 26.* nihilo tamen secius non ausus est omnem de polypis opinionem deponere , veritus , utpote vir prudentissimus , ne cui incognito & non probe perspecto assentiret.

singulis crustam polyposam emittat, aut non ejusdem crassitudinis, aut formæ, aut densitatis, aut coloris, aut structuræ.

Quamobrem mirari desines, si ventriculorum cordis alterum tantummodo polypus occupet, aut auricularum ejusdem alteram; si (a) densior, exempli gratia, in dextero cordis sinu, & tenuior occurrat in lævo, si demum alter albicat, alter flavescit, aut rubet (b). Nam albicat, qui flavescens serum expresserit; flavescit, qui multum ejus seri intus retinuerit. Etenim qui mollior est & tenerior sive



(a) *Densior polyposa concretio, quæ pertinetat in arteriam pulmonarem*, Morgagnus, epist. XXI. 29. *Sinistra concretio non minus ramosa firmiorem habuit truncum, substantiam intus compactæ carnis referentem, quod corpus quoddam quasi nerveum cingebat*, idem epist. XI. 22. *Cor concretiones duas habuit polyposas, alteram in dextero ventriculo subflavam & viscidam, quæ in auricula...alba fiebat duriorque; alteram albam & duram in sinistro ventriculo ec.* idem epist. VII. 9. Postrema hac observatione confirmantur quæ modo dicta sunt de crustæ sanguinis polypique colore. Flavescibat polyposa concretio, quæ viscidior erat molliorque, nimirum ejus ea pars, quæ in dextero insidebat ventriculo; alba fiebat in auricula, quod ibi esset durior.

(b) *Rubet polypus*, itemque crusta sanguinis ob vim globulorum polyposis, albisque particulis interceptorum. Hinc interdum rubet adeo crusta sanguinis, ut distingui non queat, nisi bacillo perforetur.

partis albæ sanguinis prohibetur . Hinc etiam intelliges , quomodo polyposo per morbum apparente sanguine , non nisi parvula polypea crusta in dextero cordis ventriculo insederit auctore insigni Morgagno (a) : & quo demum pacto potuerint ; ut idem habet Morgagnus (b) , *cadaveris nona a morte hora dissecti fumantia calere viscera , & sanguinem ex eorum incisis venis calentem exire & fluidum ; tamen polyposæ concretioneseductæ sint postea non modo e cruralibus venis , sed etiam e corde* (ubi notes velim æqualem per morbum fuisse pulsum , nec reliqua signa fuisse observata polypis affigi solita) intelliges , inquam , quo pacto id omne quivis fieri , si animadverteris crustam sursum tolli , cogique , dum sanguis adhuc calet ; pariterque in lagena concrecere , quæ demissa in calidam fuerit ; non secus atque in suspensorum canum vasis , adhuc ubique calentium .

Tum assensum retinueris si quis Mal-




(a) *Epist. XXI. art. 34.*

(b) *Epist. cit. art. 6.*

riculæ , tum ejusdem ventriculi , qui vitio careant , sanguine maximopere dilatantur , tum præsertim accidit cum eorum parietes minus fuerint lacertosi , minusque ideo resistentes . *In hominibus* enim , docente immortalis Harveo (a) , cernuntur *plures lacertuli in sinistro cordis ventriculo , quam in dextero ; plures in ventriculis , quam in auriculis , & aliquibus in auriculis quasi nulli* : in torosis , musculosis , & agrestibus corporibus , & durioris habitus plures ; in teneris corporibus , & feminis pauciores .

Postremo nihil æque ac polypi situs in mortuis celeberrimi Haenii sectatores , si qui sunt , convincere potest (nam ullos esse vix convenit credere) qui putant universos polypos in vivis gigni , alios quidem longe ante mortem , quos in malum omen ducant , alios vero (b) prope



(a) De mot. sang. pag. m. 192.

(b) Perexiguo tremuloque morientium pulsu polypos gigni putat Haenius *Rat. med. part. I. pag. 7.* qui aeris frigore in cadavere coagulati cordis parietibus , valvularumque marginibus affigantur . Cui quis posset reponere ; primum , partem albam rubramque sanguinis in suspensis canibus laqueo corporari , figurari , ac solidescere , priusquam accedat frigus , ut di-

interitum ; secus atque opinati sunt sagacissimi naturæ venatores Senacus , Hallerus , Morgagnus , qui quamvis non omnes polypos , quos falsos nominant , generari arbitrentur post mortem , tamen nonnullos eorum post eandem ortum habere non du-



ctum est antea. Deinde tali vel minimo cordis in morientibus pulsu sanguis ne coeat , effici putat Higmorus *differt. anat. lib. II. p. 2. cap. 6. pag. 158*. Si non coit , nec polypum creat ; sin coit , & creat , non erit mortuum corpus sine polypis ullum , quo nihil est minus veritati consentaneum . Et quem putat confici polypum ramulo sanguinem agitando , dum fluit e vena , aut lagenæ concussu , qua idem accipitur : itemque quam membranam e sanguine quassato a Ruyschio paratam , vocat polypi perfecte æmulam (cui adjungi potest artificiosa caro manu compacta , quam ex Knoefelio Takius refert , quamque & Kengerus ex sanguine notat conflare aqua calente recepto) cum eidem artificioso polypo , tum membranæ carniq̃ue arte paratæ firmitas deest , qua polypus in mortuis , & crusta sanguinis gaudent , deest robur , deest elasticitas , pariterque flavedo , qua polypus & crusta ut plurimum non carent ; neque quod ex his utrisque , sensim ex his serum exprimitur , quod nec similiter contrahantur . Par est ratio sanguinis , qui e pleuriticis , ex. gr. ducitur , cujus particulas bacillo , vel manu , dum fluit e vena , vel statim atque defluxus est sive fortiter quasces , sive leviter leniterque commoveas , non concret , ut facit , si quiete fruatur ; nec unquam sic in partes dividitur , ut quæ rubra sit grumi basim construat solidata , quæ vero alba est , coacta fastigium componat .

bitant . Quod nisi res ita se haberet , rationem ex Haenianis quærerem , cur si emisso sanguine qui in lagena quiescat , crusta effertur alba , non eadem efferri debeat ex eodem sempiternæ quieti tradito in vasis mortuorum , ut in polypi speciem habitumque formetur ; cum a sanguinis crusta , ut dictum est antea , non differant polypi , atque ab utrisque figura referatur vasorum , in quibus concreverant . Quod ne negatum quidem legimus a clarissimo Zollicoffero (a) scribente : *eo ritu quo sanguis pleuriticorum, cachecticorum ec. venæ sectione emissus , dum motum , partes ejus omnes antea miscentem , & invicem volventem , paulatim perdit , crassam albam & densam polypo nostro substantiam omnino similem* (notes velim posteriora hæc verba de perfecta inter polypum & crustam similitudinem ex ejus ore excidisse , qui polyporum ortum in vivis defendere enititur) *in superficie protrudit , talem in ejusmodi subjectis concretionem in corde & vasis ejus post mortem , æque ac in sanguine emisso fieri posse , nihil est ,*

(a) *Desert. de cord. polyp.* §. 13.

Quam , dextera incisa auricula , mox vidimus in venam cavam suis ramis pertinentem . Ita Morgagnus (a) . Oportuit dexteram auriculam , in qua prædictus inventus fuerat polypus , sublimiorem fuisse ventriculo dextero , ideoque in eundem ventriculum dexterum descendisse sanguinem suapte pondere post mortem , ex eoque partem albam sanguinis repulsam fuisse in dexteram auriculam , ibique in polypum fuisse formatam . Variare enim situm cordis solere notissimum est cum in viventibus natura , tum in mortuis partium circumpositarum pressu . Quocirca verisimile est concretiones polyposas , quas idem Morgagnus descripserat (b) teretes , albasque , & nonnullas crassas & firmas , longas etiam , quæ a dextera auricula ad internas jugulares venas pertinebant , a cordis orificiis in vasa , arteriosa quoque productæ passim reperiebantur , constructas fuisse a nigro sanguine in cordis ventriculum delapso , & polyposam partem in superiorem auriculæ dexteræ & vasorum se-

(a) *Epist. XI. art. 22.*

(b) *Epist. XXXV. art. 12.*

esse in mortuis , coagula autem , quæ in vasis sanguiferis reperis varia , variæque figuræ , consistentiæ , colorisque , effectum esse mortis , vel potius effectum sanguinis post mortem huc illucque pro sua gravitate affluentis , atque ibi collecti ac frigefacti , & in multiplices formas redacti ; qua re majorem aliquando quam pro consuetudine est , adipiscuntur demensionem vasa , aut viscera , horum eorundem colore ipso mutato aut alterato ; & ex qua enascuntur , quos appellas polypos , concretiones , carunculas , strias , & hujusmodi alia atque alia , pro morborum causis habita ; si hæc , inquam , tenueris , ut nostris conatibus spes est , haud dubito , quin videas systema medicum doctrina instructum humorum , seu materiæ , ut in scholis , præcipue fluidi sanguinei , maxima parte collabi .

Et sane mirari licet , quod cum corpus humanum ex solidis & fluidis constet , humores fere semper esse , quibus morbi fiant , crediderint veteres , & crediderint recentiores , præcipue post circulationem inventam sanguinis , & post tot institutas cadaverum incisiones . Quam ob rem autem ita sentiant , id fortasse est causæ ,

PARAGRAPHORUM ARGUMENTA.

Præloq. **P**lurimi mortis effectus pro causis morbi & mortis sumuntur. Hos inter Sanguis est, variis in locis collectus, in aliis non existens; item sanguineæ concretiones, polypi; vasorum dilatationes; viscerum color mutatus. Celeberrimus Andreas Pasta inventor primus sanguinis motus post mortem, & polyporum strenuus pugnator. Qui motus sanguinis, quæque concretiones polyposæ, ni sedulo a Medicis perpendantur, unam pro alia morborum causam imponunt.

- §. I. Non aliis post mortem legibus vehitur sanguis, præter eam, quæ a propria gravitate suboritur; secus ac Harveus, & quotquot eum secuti sunt, recentiores Scriptores opinantur.
- §. II. Sanguinis exuberans copia quibusvis cadaverum vasis inventa non est morbi & mortis causa.
- §. III. Non vasorum inflatio, non viscerum inusitatus color incusandus pari-

ter est ; ne immerito indicationes pro ægritudinibus exinde eveniant tum sanguinis incitandi , tum detrahendi iteratis ejusdem missionibus .

§. IV. *Sanguinis motus post obitum vasorum attractioni non est tribuendus ;*

§. V. *Neque aeris vi ob humorum putredinem evoluti ;*

§. VI. *Neque arteriarum elasticitati ;*

§. VII. *Neque partium contra arterias pressui ;*

§. VIII. *Neque frigori .*

§. IX. *Recensetur historia hujus sanguinis motus a gravitate pendentis , detecti æquaque judicii lance ponderati a cl. Andrea Pasta .*

§. X. *Observationes comprobantes quidquid actum est §. II. & III. & seq.*

§. XI. *Observationes circa nonnullas causas extrinsecas , quæ perturbare valent naturalem post mortem sanguinis motum .*

§. XII. *Pergunt eadem observationes .*

§. XIII. *Sanguinis motus derivationis appellatus , non est ad rem .*

§. XIV. *Sanguineæ concretiones , polypi , & quodquod coaguli cruenti in moruorum arteriis , venis , & cordis sinu-*

bus per anatomen deteguntur , absunt dum homo vivit .

- §. XV. *Quocirca plures morbi capitis a sanguine in caput incurso ibique congesto sine ratione deducuntur .*
- §. XVI. *Sic dicito de plurimis aliis morbis , qui e sanguine stagnante manare conjiciuntur ; cum ab aliis causis repeti probabilius potuerint .*
- §. XVII. *Si polypus cernis in aneurysmatibus , inque vasis capacioribus , nequaquam alibi ; id adscribes majori sanguinis quantitati , illic post interitum collecti ; ex quo promptiores & sensibiliores polypi effici possunt , siquidem ad concretionem pronus ille sit .*
- §. XVIII. *Si eosdem polypus e corde in truncos sanguiferos exporrectos videris , post mortem sabrefactos & ipsos retine .*
- §. XIX. *Affertionibus Morgagni , atque Halleri , non ab Andreæ Pastæ argumentis plane convictorum , rationes ac experimenta objiciuntur .*
- §. XX. *Frigore sive aeris , sive febrium , congelari sanguinem , impingi , incrassari , rationi repugnat .*
- §. XXI. *Pariter rationi repugnat sanguis*

nem morari, concrefcere, frigeſieri ab animi defectione, a timore, mærore, dolore, & ſimilibus.

§. XXII. *Sanguis æternus liquor eſt, ut ait Liſterus; dummodo in vasis ſibi propriis ſe ſe contineat, homine vivente.*

§. XXIII. *Redit oratio contra aneurysmatum polypos, & ceteras quaſcunque concretiones ſanguineas.*

§. XXIV. *Ejuſdem quæſtionis continuatio.*

§. XXV. *Concluſio.*

FINIS.

NOI RIFORMATORI

DELLO STUDIO DI PADOVA.

AVendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del P. F. Serafino Bonaldi Inquisitor General del Santo Offizio di Bergamo nel Libro intitolato *De Sanguine, & Sanguineis Concretionibus &c. Josephi Pasta Junioris &c. MS.* non vi esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimenti per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Principi, e Buoni Costumi, concediamo Licenza a *Francesco Locatelli* Stampator di Bergamo, che possa essere stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 5. Aprile 1786.

(*ANDREA QUERINI Riformat.*

(*PIETRO BARBARIGO Riform.*

(*FRANCESCO MOROSINI 2. Cav. Proc. Riform.*

Registrato in Libro a Carte 186. al num. 1687,

Giuseppe Gradenigo Segr.

ERRATA

CORRIGE

Pag.	17. lin.	5. solutam ire	solutum iri
	18. not.	<i>lauguidius</i>	<i>languidius</i>
	27. lin.	3. videtur	videntur
	30. not.	arteriorum	anteriorum
	82. lin.	6. arriarum	arteriarum
	134. lin.	15. pars vero rubra	partem vero rubram
	135. lin.	13. huic	hoc
	140. lin.	17. consequatar	consequatur
	145. lin.	20. similitudinem	similitudine

